

Склад

Активні компоненти:

- Метилсульфонілметан - 2500 мг.
- Колаген - 1000 мг.
- L-аргінін - 1000 мг.
- L-лізин - 500 мг.
- Вітамін С - 500 мг.
- Глюкозамін - 150 мг.
- Хондроїтин сульфат - 150 мг.
- Босвелії сухий екстракт - 100 мг.
- Куркуми сухий екстракт - 100 мг.
- Мірри сухий екстракт - 100 мг.

Допоміжні речовини: загусники: підкислювач: лимонна кислота ароматизатор, ідентичний натуральному; підсолоджувачі: сукралоза, фруктоза; антиадгезивний агент: діоксид кремнію.

Без ГМО. Не містить глютену і лактози.

Опис

Тендісульфур Форте - це дієва комбінація комплексу натуральних речовин, амінокислот і хондропротекторів, що мають протизапальну, трофічну і знеболюючу дію і сприяють відновленню сухожилів і суглобів при запальних і дегенеративних процесах.

Показання

Тендісульфур Форте може бути рекомендований як додаткове джерело біологічно активних речовин, зокрема сірки, екстрактів лікарських рослин, колагену і інших. Сприяє нормалізації функціонування опорно-рухового апарату, профілактиці запальних процесів в сухожиллях і

суглобах, в тому числі хребта, які можуть супроводжуватися больовими відчуттями під час рухів.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 саше в день, або в іншій дозі за рекомендацією лікаря.

Вміст саше розчинити у великій склянці води, перемішати до отримання однорідного розчину і негайно випити. Рекомендується приймати Тендісульфур Форте переважно на повний шлунок, після основного харчування. Наявність твердих часток не є ознакою зміни продукту, а пояснюється екстрактами рослин, що містить продукт.

Тривалість застосування - 2 тижні. Збільшення терміну вживання рекомендується погоджувати з лікарем.

Застереження

Містить підсолоджувач. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування. При будь-якому відчутті дискомфорту після вживання продукту слід негайно припинити його вживання і звернутися до лікаря. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, годування груддю.