

Склад

діюча речовина: 1 флакон містить настойки листя евкаліпта (*Eucalypti folium*) (1 : 5) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл;

допоміжні речовини: крім екстрагента, відсутні.

Лікарська форма

Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина зеленувато-бурого кольору, зі специфічним запахом. Під час зберігання препарату можливе утворення осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби для місцевого застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинаміка

«Евкаліпта настойка» має у своєму складі дубильні речовини, елагову кислоту, флавоноїди, смоли, віск, ефірну олію, до складу якої входять різні терпенові сполуки, особливо активні щодо грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, що згубно впливають на гриби та найпростіші. Евкаліпт пригнічує ріст золотистого стафілококу, ешерихій, туберкульозних мікобактерій, трихомонад, дизентерійної амеби. Основним компонентом ефірної олії є цинеолмоноциклічний терпен. «Евкаліпта настойка» має антисептичну, протизапальну і дезінфікуючу дію, зумовлену окислювальним ефектом цинеолмоноциклічного терпену і протизапальним впливом, пов'язаним практично з усіма фізіологічно активними речовинами, що входять до її складу. Препарат проявляє також помірний седативний (заспокійливий) вплив.

Фармакокінетика

Не вивчалася.

Показання

Запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, носоглотки та ротової порожнини (трахеїт, ларингіт, фарингіт, гінгівіт, стоматит), ушкодження шкіри (у тому числі інфіковані рани), а також легкі форми невротичних розладів (дратівливість, емоційна лабільність, порушення засинання та сну).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Бронхіальна астма, бронхоспазм. Запальні захворювання шлунково-кишкового тракту та жовчовивідних шляхів. Захворювання печінки з тяжким перебігом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

Оскільки до складу препарату входить етанол, настоянку не рекомендується приймати протягом тривалого часу.

«Евкалипта настоянка» є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Слід утриматися від керування транспортними засобами або роботи з потенційно небезпечними механізмами на період застосування препарату внутрішньо.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Оскільки до складу лікарського засобу входить етанол, настоянку не рекомендується застосовувати внутрішньо жінкам у період вагітності або годування груддю.

Спосіб застосування та дози

«Евкалипта настоянку» приймати внутрішньо, а також застосовувати для полоскання та парових інгаляцій.

Дорослим рекомендується приймати внутрішньо по 15–30 крапель настоянки 3–4 рази на добу після їди; дітям віком від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3–4 рази на добу після їди.

Для полоскання розвести 10–15 крапель настоянки у 200 мл теплої кип'яченої води.

Парові інгаляції проводити за допомогою інгаляторів будь-якого типу, застосовуючи «Евкалипта настойку» у нерозведеному стані або після попереднього розведення її водою (як для полоскання).

Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого лікувального ефекту і визначається лікарем індивідуально.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.

Діти

Не застосовувати внутрішньо дітям віком до 12 років через вміст етанолу.

Передозування

Не встановлено.

Побічні реакції

Реакції з боку імунної системи: при підвищеній чутливості до препарату можуть виникнути алергічні реакції (у тому числі кропив'янка, почервоніння та висипання на шкірі, свербіж, набряк Квінке), іноді – контактний дерматит (у ділянці губ).

З боку органів травлення: нудота, блювання та діарея.

При виражених реакціях застосування препарату слід припинити.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 мл у флаконах-крапельницях.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «Тернофарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 46010, м. Тернопіль, вул. Фабрична, 4.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).