

Опис

Антиперспірант Etiaxil Normal - ефективний роликаний антиперспірант нічної дії для нормальної шкіри, який забезпечує тривалий захист від звичайного (помірного) і підвищеного (гіпергідроз) потовиділення і запаху поту в області пахв. Запобігає будь-які прояви запаху і вологості в пахвових западинах при різних фізичних навантаженнях (від невеликих до надмірних), психоемоційних станах будь-якого ступеня інтенсивності, а також в умовах підвищених температур (від + 25С і вище). Одне нанесення на ніч забезпечує захист від поту і запаху до 5 днів, антиперспірант зберігає свій ефект незалежно від щоденних водних процедур. Користуватися Etiaxil Normal досить 1 або 2 рази на тиждень або рідше, в залежності від ступеня вираженості потовиділення. Одного флакона вистачає на 4-6 місяців.

Унікальна запатентована формула, тривалість дії

Etiaxil Normal забезпечує ефективний та тривалий захист від звичайного (помірного) і підвищеного (гіпергідроз) потовиділення на ділянках пахв що підтверджено клінічними випробуваннями. Відповідно до міжнародної класифікації засобів від поту Etiaxil Normal відноситься до класу «екстра-ефективних».

Ефективний антиперспірант

Після одного нанесення на ніч Etiaxil Normal забезпечує захист від поту та запаху до 5 днів в залежності від інтенсивності потовиділення.

Безпечний засіб від поту

Etiaxil Normal є безпечним, нетоксичним засобом, який не розчиняється в організмі людини і не порушує функцій потових залоз, нормалізуючи їх роботу. Позбавлений парфумерного запаху, має безбарвну гелеву основу, швидко висихає, не залишає слідів на білизні.

Універсальна дія

Etiaxil Normal підходить як для жінок, так і для чоловіків з нормальним типом шкіри та може поєднуватися з будь-якими дезодорантами-антиперспірантами, духами чи туалетною водою.

Діє вночі

Etiaxil Normal - ефективний антиперспірант нічної дії. Вночі потові залози менш активні, тому Etiaxil Normal встигає активувати свої властивості, поки організм

відпочиває. Антиперспірант слід наносити тільки на ніч перед сном на суху, неподрознену шкіру.

Економічний засіб від поту

Флаконе ємністю 15 мл вистачає на 5-7 місяців в залежності від інтенсивності потовиділення. Сильний антиперспірант Etiaxil Normal наноситься 1 раз на протязі 3-5 днів на ніч перед сном та зберігає свій ефект незалежно від щоденних водних процедур.

Спосіб застосування

1. Антиперспіранти Etiaxil наносяться тільки на ніч на ділянки пахвових западин, так як вночі потові залози менш активні. Не слід застосовувати Etiaxil вранці або протягом дня;
2. Заборонено наносити Etiaxil на подразнену або пошкоджену шкіру. Не можна використовувати антиперспірант відразу після депіляції (застосування можливе мінімум через 48 годин) а також не можна робити депіляцію менше ніж за 48 годин до повторного нанесення Etiaxil на ніч, інакше можуть відчуватися дискомфорт, свербіння або печіння. Найбільш зручною схемою використання Etiaxil є нанесення його ввечері, а виконання депіляції - на ранок наступного дня;
3. Перед застосуванням антиперспірантів від поту Etiaxil необхідно промити пахви прохолодною водою з милом і ретельно, насухо витерти ділянки для нанесення. Можливо висушити шкіру феном. Не можна наносити Etiaxil на вологі або напіввологі пахви;
4. Etiaxil наноситься по центру сухих неподрознених пахв двома-трьома рухами роликowego антиперспіранту вгору-вниз. Після нанесення Etiaxil дайте йому висохнути 3-4 хвилини або скористайтесь для цього феном. До ранку області нанесення засобу від поту не повинні контактувати з водою;
5. Вранці помийте пахви водою з милом.

Описана процедура нанесення засобів від поту Etiaxil повторюється 1-2 рази на тиждень, залежно від інтенсивності потовиділення (звичайна або підвищена пітливість, гіпергідроз). При рясному потовиділенні і гіпергідрозі зазначену процедуру повторюють 2-3 вечори поспіль - для досягнення максимального ефекту. Відкритий флакон який використовується слід зберігати і транспортувати тільки в вертикальному положенні.

Застереження

1. Антиперспірант Eтіaxil зазвичай не викликає алергії і при правильному використанні є ефективним і безпечним засобом від поту і запаху. Якщо все ж таки будь-яка алергічна реакція виникла, необхідно припинити використання засобу;
2. Уникайте потрапляння Eтіaxil в очі, рот, геніталії та інші слизові оболонки;
3. Не дозволяйте дітям користуватися антиперспірантами Eтіaxil. Проблеми з пітливістю у дітей рідко виникають до початку статевої зрілості;
4. Eтіaxil може знебарвити деякі тканини одягу, в якій ви спите. Уникайте контакту з засобами і полірованими металевими поверхнями.

Може спостерігатись свербіння:

1. Якщо перед застосуванням Eтіaxil на шкірі не спостерігається абсолютної сухості і відсутності пошкоджень;
2. Якщо після нанесення не дати антиперспіранту Eтіaxil повністю висохнути;
3. Якщо застосовується занадто велика кількість засобу Eтіaxil.

Склад

Alcohol Denat., Aluminum Chloride, PEG-12 Dimethicone.