

Опис

Дієтична добавка до звичайного харчового раціону.

Перед вживанням обов'язково ознайомитися з усією інформацією, що міститься в маркуванні (на упаковці, в цьому листку-вкладці).

Склад

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить:

- Екстракт енотери дворічної (*Oenothera biennis* L.) 150 mg (мг)
- Екстракт насіння фенхелю звичайного (*Foeniculum vulgare*) 100 mg (мг)
- Магній (у вигляді магнію оксиду) 100 mg (мг)
- Екстракт вітексу звичайного (*Vitex agnus castus*) 75 mg (мг)
- Екстракт вітанії снодійної (*Withania somnifera*) 75 mg (мг)
- Екстракт імбиру садового (*Zingiber officinale*) 50 mg (мг)
- Екстракт циміцифуги гроновидної (*Cimicifuga racemosa*) 25 mg (мг)
- Вітамін Е 15 mg (мг)
- Нікотинова кислота 12 mg (мг)
- Залізо (у вигляді заліза оксиду) 7.5 mg (мг)
- Вітамін В6 4 mg (мг)
- Вітамін В2 1.3 mg (мг)
- Вітамін В1 1.2 mg (мг)
- Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) 10 µg (мкг)

допоміжні компоненти: целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, крохмаль, натрію кроскармелоза, кросповідон, полівінілпіролідон, гіпромелоза, триацетин, тартразин, діамантовий синій, титану діоксид, тальк, магнію стеарат.

Без ГМО.

Форма випуску

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

Властивості

Мета вживання.

Форевія Максі це унікальний комплекс фітоекстрактів, вітамінів і мінералів, які необхідні для підтримки організму жінки при зміні гормонального фону та його

наслідках:

- психоемоційні прояви;
- зниження лібідо;
- зменшення фертильності;
- припливи;
- зміна маси тіла;
- погіршення стану шкіри, волосся та кісток;
- підвищена потреба у мінералах і вітамінах [1, 2].

Перевагами Форевії Максї можна вважати можливість індивідуального підходу до жінки, можливість комплексного охоплення кількох проявів одночасно, зручність вживання (одна таблетка на добу), можливість тривалого вживання, що особливо актуально у випадках медичних протипоказань для гормональної терапії. [2]

Ендокринологи відмічають численні фактори ризику гіпоестрогенії, які можна поділити умовно на:

1. ендогенні, а саме:

- фізіологічне зменшення функції яєчників у жінок після 40 років;
- затримка статевого розвитку;
- запалення та кістозне перетворення яєчників при синдромі полікістозних яєчників;
- новоутворення ендокринних залоз (яєчників, надниркових залоз, гіпоталамуса, гіпофіза) або їх функціональні порушення (недостатність яєчників, кори надниркових залоз, підвищення утворення пролактину, гіпо- або гіпертиреоз);
- значуща ниркова недостатність;
- аутоімунні розлади (хвороба Аддісона), генетичні синдроми (Тернера, Прадера-Віллі, Каллмана), та

2. екзогенні, серед яких:

- надмірні фізичні навантаження та стреси або гіподинамія;
- прихильність до екстремальних дієт для схуднення та розлади харчової поведінки (анорексія), наявність критичної маси тіла;
- застосування фармацевтичних препаратів (стероїдів, опіоїдів, психотропних засобів, інгібіторів ферментів синтезу естрогенів, що використовують в онкології); хірургічні втручання на статевих залозах;
- вплив променевої та хіміотерапії [2].

Рекомендації щодо застосування

Перед початком вживання рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Вживання Форевії Максї та її компонентів є доречним при проявах змін гормонального фону у таких ситуаціях

- передменструальному синдромі (ПМС);
- пременопаузі;
- менопаузі;
- зниженні рівня естрогенів;
- надмірних дискомфортних відчуттях у репродуктивних органах [3-11].

Доречність вживання екстрактів рослин та інших компонентів Форевії Максї при проявах гормонального дисбалансу в різні періоди життя жінки [2]

Стан	Прояви	Фіто-екстракти	Мінерали	Вітаміни
Передчасна гіпоестрогенія	Вазомоторні:	Вітанія		
	<ul style="list-style-type: none"> • задуха, • припливи жару, • пітливість, • колювання артеріального тиску 	Вітекс Енотера Фенхель Циміцифуга		Віт. Е
	Урогенітальні:	Вітанія		
Періменопауза	<ul style="list-style-type: none"> • сухість та атрофія піхви, • нетримання сечі, • диспареунія 	Енотера Фенхель Циміцифуга	Fe	Віт. D
Менопауза	Зміни стану шкіри та волосся	Імбир Циміцифуга	Fe	Віт. D Віт. Е Віт. B2 Віт. B6

Зменшення тонуусу маткн та пїхвн, атрофїя пїхвн	Вїтанїя Цнмїцнфуга	Mg	Вїт. E Вїт. D
Втомлюванїсть та зменшення м'язовї силн	Вїтанїя Цнмїцнфуга	Fe	
Швндкї та частї змїнн настрою, занепокоенїсть, дратївлнвїсть, депресїя	Вїтекс Фенхель Цнмїцнфуга		Вїт. D
Зменшення сексуальностї, лїбїдо	Вїтанїя Енотера Цнмїцнфуга		
Когннннвннї: проблемн з пам'яттю, увагою, концентрацїєю	Вїтанїя їмбнр	Fe	Вїт. B2 Вїт. B6
Порушення сну	Вїтанїя Вїтекс Цнмїцнфуга		

Остеопоротичні зміни кісткової тканини	Імбир Циміцифуга		Віт. D Віт. E Віт. B2 Віт. B6	
Залізодефіцитна анемія		Fe		
Зменшення фертильності Перед-менструальний синдром	Дисфункція яєчників	Вітекс Енотера Циміцифуга	Fe	Віт. E
	Деактивація мітогенних метаболітів естрогенів		Mg,	Віт. E Віт. B6
	ПМС	Вітекс	Mg	Віт. B1 Віт. B2
	Зміни ендометрію матки	Вітекс Енотера Циміцифуга,	Mg	Віт. E
	Масталгія, відчуття набрякання грудей, набряки, головний біль	Вітекс Енотера Фенхель,		Віт. E Віт. B6 Віт. D

блювота, діарея, головний біль, стомлюваність та сонливість. Біль у животі, занепокоєність, дратівливість, депресія	Вітекс Фенхель Циміцифуга		Віт. В6 Віт. D Нікотинова кислота (Віт. РР)
---	---	--	---

Застереження

У випадку небажаних ефектів необхідно припинити вживання та звернутися до лікаря!

Не використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форевія Максі не є лікарським засобом.

Спосіб застосування

З метою підтримки гормонального балансу: дорослим по 1 таблетці на ніч після їди або за індивідуальною схемою за призначенням лікаря. Тривалість вживання від 3 до 6 місяців. Тривалість вживання, при потребі, можна подовжити.

Діти.

Форевію Максі не можна вживати дітям.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

Є ймовірність взаємодії з агоністами та антагоністами дофаміну, естрогенами та антиестрогенами через наявність у складі екстракту *Вітексу звичайного*.

Передозування

Реакції при перевищенні рекомендованої добової норми невідомі.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Особливості застосування

Не можна вживати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів.

Упаковка

По 30 або 60 таблеток, вкритих плівковою оболонкою, у банці. По 1 банці в картонній коробці з листком-вкладкою.

В банці може знаходитися адсорбент вологи, який не є їстівним!

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище +30 °С в захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Не вживати після закінчення терміну придатності.

Виробник

Пракруті Продактс Пвт. Лтд.