

## **Склад**

У 100 мл міститься: Вода, Мальтодекстрини, Білки молока, Соева олія, Білки сої, Масла, що містять МСТ, Кальцію цитрат 0,33 г, Калію цитрат 0,23 г, Риб'ячий жир, Калію ортофосфат 0,13 г, натрію хлорид, емульгатори: E322 і E471, Магнію карбонат 0,08 г, Калію хлорид, Холіну хлорид 0,04 г, Вітамін С 10 мг, цинку сульфату 3,0 мг, Заліза (II) сульфат 2,9 мг, Нікатінамід 1,8 мг, Вітамін Е 1,7 мг, Заліза (II) сульфат 2,6 мг, Пантотенат кальцію 0,65 мг, Міді (II) сульфат 0,59 мг, Марганця (II) хлорид 0,59 мг, Вітамін В<sub>1</sub> 0,25 мг, Вітамін В<sub>6</sub> 0,24 мг, натрію фторид 0,22 мг, Вітамін В<sub>2</sub> 0,20 мг, Вітамін А 0,11 мг, Бета-каротин 0,10 мг, Фолієва кислота 30 мкг, Хрома (III) хлорид 23 мкг, Натрію молібдат 23 мкг, натрію селеніт 21 мкг, Калію йодид 17 мкг, Вітамін К<sub>1</sub> 7 мкг, Біотин 5 мкг, Вітамін D<sub>3</sub> 1,0 мкг, Вітамін В<sub>12</sub> 0,24 мкг.

## **Рекомендації щодо застосування**

Нутрікомп Стандарт Нейтральний призначається для пацієнтів, які потребують ентерального харчування. При відсутності можливості звичайного харчування, використовується метод всмоктування поживних речовин через слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Суміш застосовується в різних сферах і при різних діагнозах.

Серед показань виділяють основні:

- Виснаження організму, білково-енергетична недостатність
- Нутритивна підтримка в перед- і післяопераційний період
- Травми: опікові, черепно-мозкові, множинні пошкодження
- При ускладненнях в післяопераційний період
- Гострі екзогенні отруєння
- Нейрогенная ротоглоткова дисфагія

Також, використовується в неврології, онкології, психіатрії, геріатрії, в коматозних станах і при хворобах шлунково-кишкового тракту.

Підходить для корекції фігури під час інтенсивних тренувань.

## **Спосіб застосування**

Дозування призначається тільки лікарем, і залежить від віку і діагнозу. В середньому на добу приймається 1500-2000 мл.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до компонентів препарату. При гострому деструктивному панкреатиті. Наявність кишкової непрохідності. Печінкова або ниркова недостатність дозволяють прийом тільки в обмежених дозах.

**Термін придатності**

12 місяців.