

Склад

діючі речовини: формальдегід, етанол;

100 мл розчину містять розчину формальдегіду в перерахуванні на 35 % вміст формальдегіду - 10,0 г, етанолу 96 % - 39,5 г;

допоміжні речовини: одеколон, вода очищена.

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина з ароматним запахом.

Фармакотерапевтична група

Дерматологічні препарати. Засоби, що застосовуються при гіпергідрозі.

Код АТХ D11A A.

Фармакологічні властивості

Препарат чинить дезінфікуючу та дезодоруючу дію.

Показання

Формідрон застосовують для обробки шкіри при підвищеній пітливості.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Захворювання шкіри. Дитячий вік до 14 років.

Особливі заходи безпеки

З обережністю призначається хворим літнього віку та в період вагітності. Не наносити на обличчя з метою запобігання подразненню. Не допускати потрапляння в очі та на слизові оболонки.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Особливості щодо застосування

Різке почервоніння і свербіж шкіри після нанесення препарату свідчать про індивідуальну підвищену чутливість до останнього і вимагають негайного припинення застосування препарату.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Застосовують зовнішньо. Дорослим і дітям старше 14 років протирають шкіру ватним тампоном, змоченим препаратом, 1-2 рази на добу.

Діти.

Не застосовується у дітей віком до 14 років.

Передозування

Не слід допускати передозування препарату. При тривалому та частому застосуванні у разі почервоніння, свербіжу, подразнення, що є ознаками передозування, необхідно припинити лікування препаратом. Препарат змити водою зі шкірних покривів. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти

Подразнення шкіри, алергічні реакції, відчуття свербіжу.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності

4 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мл у флаконах скляних. По 50 мл у флаконах полімерних в пачці або без пачки. По 100 мл у флаконах скляних або полімерних в пачці або без пачки. По 100 мл у флаконах полімерних з механічним розпилювачем.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».