

Склад

діючі речовини: 1 мл розчину містить фуксину основного - 4,0 мг, кислоти борної - 8,0 мг, фенолу - 39,0 мг, ацетону - 0,049 мл, резорцину - 78,0 мг;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена

Показання

Для лікування захворювань шкіри, спричинених чутливими до компонентів препарату збудниками: різні види дерматоміцетів (трихофітони, мікроспори, епідермофітони), мікробна екзема, жирна та змішана форми себореї.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість шкіри до компонентів препарату.
Хронічні алергічні дерматози.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Слід уникати одночасного застосування протигрибкових антибіотиків місцевого застосування, таких як гризеофульвін, клотримазол; препаратів, до складу яких входить фенол, борна кислота, а також гормональних препаратів. При одночасному застосуванні з препаратами для зовнішнього застосування можуть виникати алергічні реакції.

При одночасному застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід повідомити лікаря.

Особливості щодо застосування

Лікування препаратом слід здійснювати під контролем лікаря та дотримуватися рекомендованих доз.

Не наносити препарат на великі ділянки тіла та не допускати потрапляння препарату в очі.

Хворим із порушеннями функцій нирок лікування препаратом слід проводити з обережністю.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати жінкам у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Впливу на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами не виявлено.

Спосіб застосування та дози

Розчином змащувати уражені ділянки шкіри і слизових оболонок 1-3 рази на день до клінічного одужання. Курс лікування визначає лікар.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Побічні ефекти

Реакції гіперчутливості, включаючи анафілактичний шок, кропив'янку, ангіоневротичний набряк; місцеві алергічні реакції (у т. ч. висипи, гіперемія, набряк, свербіж у місці нанесення).

У деяких пацієнтів, особливо при тривалому застосуванні, можуть виникати явища запаморочення, слабкості, розлади дихання, судом,

сплутаність свідомості, головний біль, нудота, блювання, діарея, олігурія, десквамація епітелію.

При появі таких симптомів необхідно змити залишки препарату з поверхні шкіри водою; відмінити препарат та призначити симптоматичну терапію.

У разі появи будь-яких небажаних явищ, необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності

2 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці!

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Форма випуску

По 25 мл у флаконах (без пачки або у пачці).

Виробник

ФОП Ленчін В.М., Україна