

Склад

1 капсула містить: активний інгредієнт: мастику Хіос (*Pistacia lentiscus*), порошкоподібну - 350 мг (mg); допоміжні речовини: наповнювач: мальтодекстрин, антизлежувач: кремнію діоксид; оболонка капсули: желатин, барвник: титану двоокис.

Властивості

Функціональні властивості дієтичної добавки «Мастикозин» обумовлені компонентом, що входить до її складу.

Мастика Хіос - це натуральний продукт, отриманий з мастикового дерева *Pistacia lentiscus* грецького острова Хіос розташованого в північній частині Егейського моря. Її терапевтичні властивості були відомі ще з античних часів Греції. Традиційно у Греції її використовують для покращення травлення, а віднедавна встановлено, що компоненти мастики можуть бути корисними для знищення бактерії *Helicobacter pylori* та для захисту слизової оболонки шлунка. Так підтверджено, що компоненти ефірної олії мастики α -терпінеол та (E)-метилізоевгенол виявляють активність щодо чотирьох різних штамів *Helicobacter pylori*, які були виявлені у пацієнтів з гастритом, виразкою шлунка та новоутвореннями шлунка. Механізм її дії в такому випадку полягає в тому, що тритерпенові кислоти викликають морфологічні відхилення в клітинах *Helicobacter pylori* та порушують клітинну фрагментацію.

В одному рандомізованому клінічному дослідженні було встановлено, що мастика хоч і не замінює традиційне протокольне лікування із використанням таких засобів як пантопразол, амоксицилін, кларитроміцин, проте, у ряді випадків, також повністю знешкоджує *Helicobacter pylori*.

Дослідники також виявили, що в учасників, які приймали мастику на додаток до антибіотиків, рівень ерадикації був вищим ніж у пацієнтів, що отримували лише стандартну антибактеріальну терапію. Причому *Helicobacter pylori* розвивала стійкість до антибіотиків, тоді як мастика не змінювала свою антибактеріальну ефективність.

Тому мастику Хіос рекомендовано застосовувати до раціону харчування в період захворювань зумовлених інфікуванням *Helicobacter pylori*, як додаткове джерело терпенів та антрахінонів, рослинних олій з антихелікобактерною активністю. Використання в комплексній терапії хвороб шлунково-кишкового тракту (виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, гастриту), спричинених *Helicobacter pylori*, можливе тільки за рекомендацією лікаря.

Рекомендації щодо застосування

До раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин, що сприятливо впливають на функціональний стан шлунка та мають обволікаючі властивості.

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування

Дорослим та дітям віком від 12 років вживати по 1 капсулі 2-3 рази на добу за 20-30 хвилин до прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Термін вживання

10-14 днів. Подальше застосування та можливість повторного курсу рекомендовано узгоджувати з лікарем.

Застереження

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Вагітність та період лактації, діти віком до 12 років, підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Виробник

ТОВ «БІХЕЛС», Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 41;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Україна, 04208, м. Київ, проспект Правди, 80-В.

ТУ У 10.8-38639061-002:2015