

Опис

АРГЕТТ знеболючий пластир з Лідокаїном призначений для місцевого застосування.

АРГЕТТ ФОРТЕ знеболючий пластир з Лідокаїном за рахунок еластичної властивості основи призначений для фіксації ураженої ділянки м'язу або суглобу. Ментол 1% охолоджує пошкоджену ділянку суглоба або м'яза, а лідокаїн 4% сприяє тимчасовому полегшенню болю в місці ураження.

АРГЕТТ знеболючий пластир з Лідокаїном застосована технологія гідрогелевого нанесення ментолу та лідокаїну для максимальної дії та тимчасового полегшення болю в спині, шиї, кінцівках, м'язах та суглобах.

Компоненти пластиру - ментол 1% та лідокаїн 4% вивільняються з гідрогелевої основи та проникають через шкіру і надають тимчасову безпечну дію при запаленнях суглобів, м'язів, зв'язок, сухожилів, викликаних травмою, при розтягненнях, вивихах, синцях, невралгіях (запаленнях нервових закінчень), міалгіях (запаленнях м'язів).

Органічна речовина **Ментол 1%** - має охолоджуючу, антисептичну та анестезуючу дії. Знеболювальній дії ментолу передують відчуття холоду, легке печіння і поколювання. Профіль дії ментолу зумовлений рефлекторною реакцією шкіри у відповідь на подразнення її рецепторів.

Активна речовина **Лідокаїн 4%** використовується для тимчасового полегшення болю в різних частинах тіла, спричиненого травмою або запальним процесом. Профіль дії лідокаїну, як місцевого анестетика, характеризується швидким початком.

Склад

Компоненти: лідокаїн 4%, ментол 1%; допоміжні інгредієнти: гліцинат алюмінію, гліцерин, каолін, метилпарабен, поліакрилова кислота, полісорбат 80, пропіленгліколь, пропілпарабен, повідон, Поліакрилат натрію, винна кислота, діоксид титану, очищена вода.

Показання до використання

Для фіксації ураженої ділянки м'язу або суглобу, а також - тимчасового (до 12 годин) полегшення гострого та хронічного болю. При запаленнях суглобів, м'язів, зв'язок, сухожилів, викликаних травмою, розтягненнях, вивихах, синцях,

невралгіях (запаленнях нервових закінчень), міалгіях (запаленнях м'язів) у дорослих та дітей віком від 12 років.

Спосіб застосування

Тільки для зовнішнього застосування. Очистити і просушити шкіру у місці болю та накласти пластир, попередньо звільнивши від захисного паперу. Час використання одного пластиру зазвичай становить 12 годин. Застосовують по 1 пластиру 2 рази на добу вранці та ввечері. При необхідності можна розрізати пластир і використовувати його частину, відповідно до площі ураженої ділянки.

Схема нанесення:

1. Зігнути пластир посередині і звільнити частину поверхні від захисного паперу.
2. Прикласти пластир до ураженої ділянки та витягнути другу частину захисного паперу з-під пластиру.
3. Розгладити для запобігання утворення складок та потрапляння повітря під пластир.

Застереження

Медичний виріб не призначено для застосування всередину.

Не застосовувати на ділянках шкіри з густим волоссям.

Припинити використання пластиру і звернутися до лікаря слід: у разі погіршення стану шкіри (поява висипу, свербіж або сильне подразнення шкіри), при збереженні болю протягом 3 днів або повторній появі симптомів після нетривалого поліпшення стану.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових пластиру. Інгредієнти пластиру не потрапляють у системний кровотік, але не рекомендовано застосовувати при виразці шлунка або 12-палої кишки, при шлунково-кишкових кровотечах, при бронхіальній астмі в анамнезі, при серцевій недостатності, важких формах печінкової та ниркової недостатності, вагітним жінкам та жінкам у період лактації, дітям віком до 12 років.

Не допускати контакту поверхні пластиру з очима, слизовими оболонками.

Не застосовувати на відкритих ранах або ділянках шкіри з патологічними змінами, такими як екзема, акне, дерматити, запалення або інфекції різного походження.

Форма випуску

По 4 саше у ZIP пакеті в картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у захищеному від світла, сухому та недоступному для дітей місці. Після першого відкриття саше використати пластир протягом одного місяця.

Термін придатності

3 роки.

Виробник

Delta Medical Promotions AG 26 Oetenbachgasse, Zurich, CH-8001,
Switzerland/Дельта Медікел Промоушнз АГ, Отенбахгассе 26, Цюрих, CH-8001,
Швейцарія.

Адреса виробничої ділянки: No.33, Qinglian Road, Xuguan Industrial Park, Suzhou
Hi-Tec Development Zone, Suzhou, 215151, P.R.China/№ 33, Кінгліан Роуд, Ксугуан
Індастріал Парк, Сужоу Хай-Тек Девелопмент Зон, Сужоу, 215151, КНР.