

Склад

1 шипуча таблетка містить: активні інгредієнти: L-аскорбінова кислота (Вітамін С) - 500 мг, цитрат цинку - 31,5 мг;

допоміжні речовини: регулятори кислотності: кислота лимонна, натрію гідрокарбонат;

підсоложувачі: сорбітол, аспартам, натрію сахаринат, ароматизатор "Лимон";

барвник: рибофлавін-5-фосфат натрію.

Показання до використання

Рекомендовано вживати як джерело вітаміну С та цинку при їх недостатності в організмі; для забезпечення їх підвищеної потреби у період гострих респіраторних та інфекційних захворювань. Вітамін С та цинк сприяють нормальній роботі імунної системи та захисту клітин від оксидативного стресу. Вітамін С має протизапальні та антиоксидантні властивості, сприяє підтриманню нормальної роботи імунної системи під час та після інтенсивних фізичних навантажень, сприяє зниженню втоми та втомлюваності. Цинк бере активну участь у зміцненні захисних функцій організму та сприяє підтриманню бар'єрної функції легень при запаленні. Дефіцит цинку асоційований з підвищенням ризику респіраторних інфекцій осіб похилого віку.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, цукровий діабет, схильність до тромбозів, тромбофлебіт, сечокам'яна хвороба, дитячий вік. У цьому дозуванні продукт не призначений для застосування в період вагітності та годування груддю

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 шипучій таблетці на добу, після прийому їжі, попередньо розчинивши у склянці питної води кімнатної температури. Курс споживання - 2 тижні. При необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.