

Загальна характеристика

Дитяче ентеральне харчування – харчовий продукт для спеціальних медичних цілей Фортіні / Fortini з харчовими волокнами. Напій рідкий, готовий до вживання, повноцінний, високоенергетичний, для дітей від 1 року, які не бажають або не здатні споживати достатню кількість звичайних продуктів для задоволення власних харчових потреб.

- Висококалорійний продукт (1,5 ккал/1 мл) у малому об'ємі для нормального росту або поповнення втрат енергії під час хвороби або в період відновлення.
- Вміст білка 3,3 г/100 мл дозволяє забезпечити високі білково-енергетичні потреби. Білок представлений 100% казеїном, який є джерелом незамінних та замінних амінокислот.
- Низький вміст лактози для полегшення процесу травлення (менше 0,025 г/100 мл).
- Харчові волокна 1,5 г/100 мл задля підтримки функції ШКТ. Вони представлені комбінацією з 6 розчинних і нерозчинних харчових волокон MF6, які відображають пропорцію різних типів клітковини при здоровій дієті. Нерозчинні волокна нормалізують перистальтику кишечника (профілактика діареї та запорів), а розчинні волокна забезпечують пребіотичний ефект, оскільки є поживним субстратом для корисної мікрофлори кишечника, що продукує коротколанцюгові жирні кислоти (місцевий трофічний ефект – прискорення регенерації та загоєння слизової оболонки кишечника). Продукт підходить для дітей, що не мають обмежень щодо прийому харчових волокон. *
- Каротиноїди – природні органічні пігменти, що містяться в фруктах та овочах, у Fortini Multi Fiber (0,15 мг/100 мл) виконують антиоксидантну функцію та мають імуномодулюючу дію. **
- Не містить глютену.
- Запаковано в захисному середовищі.

Показання

- поганий апетит;
- підвищена розумова та фізична активність у дітей;
- забезпечення достатньої кількості енергії та поживних речовин для оптимального росту та розвитку;
- підвищена потреба в поживних речовинах та енергії (гострі та хронічні захворювання в період лікування та відновлення);
- для дітей, які не можуть або не бажають їсти достатню кількість звичайних продуктів для задоволення своїх харчових потреб;
- проблеми шлунково-кишкового тракту: закрепи, діарея, запальні захворювання кишечника, променеий ентерит і хіміотерапія, синдром короткої кишки;
- розлади харчування, що супроводжують хронічні захворювання, напр. серцеву та/або легеневу недостатність, захворювання печінки, ВІЛ/СНІД;
- після будь-яких операцій, травм, опіків;
- неврологічні захворювання, розумові/фізичні вади, напр. дитячий церебральний параліч;
- проблеми з ковтанням/жуванням;
- після операцій на ЛОР-органах, щелепно-лицьових травм, стоматологічних втручань;
- мальабсорбція, муковісцидоз, целиакія;
- недостатність харчування при онкологічних захворюваннях.

Склад

Вода, мальтодекстрин, глюкозний сироп, рослинні олії (рапсова, соняшникова), **казеїнати білка з коров'ячого молока**, цукор, харчові волокна (інулін, олігофруктоза, стійкий крохмаль, **полісахариди із сої**, гуміарабік, целюлоза), какао, **емульгатор (соєвий лецитин)**, цитрат калію, фосфат кальцію, хлорид магнію, ароматизатор, дигідрофосфат калію, хлорид кальцію, хлорид холіну, каротиноїди (**містить сою**) (β-каротин, лютеїн, живиця лікопену із томатів), L-аскорбат натрію, хлорид калію, гідроксид калію, таурин, лактат заліза (II), сульфат цинку, L-

карнітин, нікотинамід, глюконат міді, ретинілацетат, селеніт натрію, сульфат марганцю (II), холекальциферол, D-біотин, D-пантотенат кальцію, ацетат DL-альфа-токоферолу, гідрохлорид тіаміну, хлорид хрому (III), рибофлавін, гідрохлорид піридоксину, фолієва кислота, фторид натрію, йодид калію, молібдат натрію, ціанокобаламін, фітоменадіон. Без ГМО. Без глютену.

Поживна цінність		на 100 ml (мл)
Енергетична цінність	кJ (кДж)/ kcal (ккал)	640/153
Жири, з них:	g (г)	6,8
Насичені	g (г)	0,7
Вуглеводи, з них:	g (г)	18,8
Цукри	g (г)	7,4
Лактоза	g (г)	<0,025
Харчові волокна	g (г)	1,5
Білки	g (г)	3,3
Сіль*	g (г)	0,16
Вітаміни:		

Вітамін А	µg RE (мкг RE)	61
Вітамін D3	µg (мкг)	1,5
Вітамін Е	mg α-TE (мг α-TE)	1,9
Вітамін К	µg (мкг)	6,0
Тіамін	mg (мг)	0,23
Рибофлавін	mg (мг)	0,24
Ніацин (преформований)	mg (мг)	0,88
Ніацин (включаючи триптофан)	mg NE (мг NE)	1,65
Пантотенова кислота	mg (мг)	0,50
Вітамін В6	mg (мг)	0,18
Фолієва кислота	µg (мкг)	23
Вітамін В12	µg (мкг)	0,26

Біотин	µg (мкг)	6,0
Вітамін С	mg (мг)	15
Мінеральні речовини:		
Натрій	mg (мг)	65
Калій	mg (мг)	153
Хлориди	mg (мг)	92
Кальцій	mg (мг)	84
Фосфор	mg (мг)	75
Фосфати	mg (мг)	228
Магній	mg (мг)	17
Залізо	mg (мг)	1,5
Цинк	mg (мг)	1,5
Мідь	mg (мг)	0,135
Марганець	mg (мг)	0,23

Фториди	mg (мг)	0,11
Молібден	µg (мкг)	6,0
Селен	µg (мкг)	4,5
Хром	µg (мкг)	9,0
Йод	µg (мкг)	15
Інше		
Каротиноїди	mg (мг)	0,15
L-карнітин	mg (мг)	3
Холін	mg (мг)	30
Таурин	mg (мг)	11
Осмолярність	mOsmol/l (мосмоль/л)	440

*наявність солі зумовлено виключно вмістом натрію природного походження.

Застереження

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря. **Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.** Може бути використане як єдине джерело харчування дітей від 1 року і старше. Через вміст харчових волокон дітям молодшого віку слід з обережністю вживати понад 4 пляшечки на день. Не є лікарським засобом.

Протипоказання

Не використовувати для дітей віком до 1 року. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Не слід використовувати для дітей, які потребують дієти без вмісту харчових волокон. Не використовувати хворим на галактоземію.

Умови зберігання

Зберігати у сухому прохолодному місці (від +5 °С до +25 °С) за відносної вологості не більше ніж 75%. Після відкриття зберігати закриту пляшечку в холодильнику і спожити протягом 24 годин.

Форма випуску

Рідкий напій у пластиковій пляшечці 200 ml (мл) □.

Виробник

Виробник: ПАТ з обмеженою відповідальністю «Нутриція», вул. Еерсте Стационсстраат, 186, 2712 НМ, м. Зутермер, Нідерланди / N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands.

Імпортер: ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2, 04080, м. Київ, Україна

Спосіб застосування

Перед застосуванням добре збовтати. Продукт готовий до вживання, найкраще смакує охолодженим. Якщо продукт споживали безпосередньо з пляшечки, його залишки заборонено використовувати для подальшого годування.