

Склад

1 супозиторій містить: суміш молочнокислих бактерій (*Lactobacillus crispatus* - $4 \cdot 10^9$ КОЕ/г (CFU/g), *Lactobacillus jensenii* - $2,6 \cdot 10^9$ КОЕ/г (CFU/g), *Lactobacillus gasseri* - $2,6 \cdot 10^9$ КОЕ/г (CFU/g)- 0,12 г (г); молочна кислота - 20 mg (мг).

Супозиторна основа: ПЕГ- 1500, ПЕГ - 6000, ПЕГ - 400, ланолін, твин-80, альгінат натрію.

Показання

Молочнокислі бактерії *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus jensenii*, *Lactobacillus gasseri* та молочну кислоту рекомендовано застосовувати з метою підтримки мікрофлори та pH піхви жінки.

Спосіб застосування

Застосовується вагінально по 1 супозиторію на добу. Супозиторій вводять якомога глибше, попередньо звільнивши від блістеру.

Умови застосування: від 5 до 30 днів або залежно від індивідуальних особливостей.

Застереження

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Під час вагітності та лактації слід проконсультуватися з лікарем. «Алактель фемі» призначений лише для дорослих.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 8 °С до 25°С - 1 рік, від 2 °С до 8 °С - 2 роки.

Дата виробництва: див. на пачці.

Використати до: див. на пачці.

Номер партії: див. на пачці.

Форма випуску

1 супозиторій масою нетто 2,25 g(г) $\pm$ 5 %, супозиторії № 5 (масою нетто 11,25 g (г) $\pm$ 5 %, по 5 супозиторіїв у блістері, по 1 блістеру в пачці.

Виробник

ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика», Україна, 61057, м. Харків, вул. Громадянська 25.

Найменування та місцезнаходження підприємства, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача та відповідає за надання продукції на ринку:

ТОВ «Озимук фарм», Україна, 02125, м. Київ, вул. Старосільська 1у, офіс 9.

ТУ У 21.2-40917126-002:2018