

## **Опис**

Проста-ЛІК СР зменшує запальний процес у простаті та полегшує симптоми простатиту, такі, як біль, дискомфорт та порушення сечовивідних функцій.

ПРОСТА-ЛІК СР СУППОЗИТОРІЇ СПРИЯЮТЬ:

- Вираженій протимікробній та протизапальній дії
- Покращують імунну систему організму та ділянку простати
- Зменшує ступінь запалення простатиту та пов'язаний з ним біль
- Розслаблюють локально м'язи анальної ампули
- Захищає запалену простату від зовнішнього впливу
- Без побічних ефектів

## **Склад**

Проста-ЛІК СР (Prosta-LIQ SR) - медичний виріб

Склад:

діючі речовини: 1 супозиторій містить лактоферину 30 мг, гліцерофосфоінозитулу 40 мг, гіалуронової кислоти 20 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний, твердий жир.

## **Рекомендації щодо застосування**

Ректальні супозиторії Проста-ЛІК SR застосовуються як допоміжний засіб при місцевому лікуванні сечостатевих та аноректальних захворювань які супроводжуються болем. Завдяки місцевій захисній і змащувальній дії, супозиторії Проста-ЛІК SR мають сприятливий вплив як при гострих, так і хронічних захворюваннях передміхурової залози, в тому числі простатиті, полегшуючи больові симптоми.

## **Спосіб застосування**

Застосовувати ректально після випорожнення кишечника, супозиторій вводити глибоко у задній прохід. Рекомендується один супозиторій на день, бажано ввечері перед сном.

Не перевищувати рекомендовану дозу.

## **Протипоказання**

Не використовувати дітям у віці до 12 років.

Застосування Проста-ЛІК SR не рекомендується у разі відомої гіперчутливості до будь-якого з компонентів;

Не використовувати у разі:

- гострий біль у животі або біль неясного походження;
- нудота або блювання;
- кишкова непрохідність або стеноз;
- ректальна кровотеча неясного походження;
- гострий гемороїдальний криз з болем і кровотечею;
- сильне зневоднення.

Люди похилого віку або люди зі слабким здоров'ям у будь-якому випадку повинні проконсультуватися з лікарем перед використанням Проста-ЛІК SR.

### **Особливості застосування**

Кожен супозиторій призначений тільки для одноразового використання і повинен бути вилучений з упаковки лише безпосередньо перед використанням: не використовуйте супозиторії, які були зламані або видалені з блистерної упаковки у невідомий час, оскільки це може призвести до ризику забруднення супозиторію; не намагайтеся повторно використовувати супозиторії, які випадково витікали після першої спроби.

Нерівномірний темний колір, який може мати супозиторій, є ознакою зниження ефективності або поганого зберігання супозиторію;

Проста-ЛІК SR не є стерильним, однак, не рекомендується використовувати супозиторії при пошкодженні первинної упаковки (блістера).

Взаємодія з іншими препаратами або медичними виробами.

Супозиторії Проста-ЛІК SR можуть скоротити час перебування в кишечнику, а отже, і всмоктування інших лікарських засобів, які одночасно приймаються перорально. Тому після перорального прийому препарату рекомендується витримати принаймні 2 години перед застосуванням Проста-ЛІК SR. У будь-якому випадку уникайте, наскільки це можливо, застосування Проста-ЛІК SR під час використання інших медичних виробів або лікарських засобів. У будь-якому випадку проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж застосовувати Проста-ЛІК SR, якщо ви пройшли будь-яку медикаментозну терапію.

### **Побічні ефекти**

Немає відомих короткострокових або середньо / довгострокових побічних ефектів. Проста-ЛІК SR не впливає на сенсорні здібності (рівень уваги, здатність

керувати автомобілем або виконувати будь-які дії). Однак у разі виникнення побічних ефектів, таких як надмірне подразнення, біль або дискомфорт, які можуть виникнути внаслідок використання медичного виробу, негайно припиніть лікування та зверніться до лікаря.

### **Термін придатності**

Строк придатності: 30 місяців.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не застосовувати при порушенні упаковки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі до 25°C в сухому, захищеному від дії сонячного світла місці. Витягувати супозиторій тільки безпосередньо перед застосуванням. Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Форма випуску**

Супозиторії ректальні по 2 г

По 10 супозиторіїв у блістері. По 1 блістеру в картонній коробці.

### **Виробник**

Виробник: Фултон Медицинали С.п.А., Віа Гульєльмо Марконі, 28/9 20044 Аресе, Італія /Fulton Medicinali S.p.A. Via Guglielmo Marconi 28/9 20044 Arese, Italy.

За ліцензією Веліт Біофарма Срл., площа Кавур 3, 20121, Мілан, Італія/ under license of Velit Biopharma Srl, Piazza Cavour 3, 20121, Milan, Italy.

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «Клімед Україна», Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 40у. тел.+38 044 228 47 17, <https://kleemed.com.ua>