

Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт стебла і листя леспедези головчатої (*Lespedeza capitata*) – 500 mg (мг), силімарін (*Silymarin*) - 75 mg (мг); допоміжні речовини: наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза, кальцію стеарат, кальцію карбонат, діоксид кремнію аморфний (орісіл), мальтодекстрин; оболонка капсули: желатин.

Не є лікарським засобом

Рекомендації щодо застосування

ДУОНЕФРИЛ® рекомендований як додаткове джерело біологічно активних речовин рослинного походження, що сприяють нормалізації функціонального стану нирок. Біологічно активні речовини ДУОНЕФРИЛ® сприяють збільшенню ниркової фільтрації та діурезу (прискорюючи виведення азотистих шлаків і може сприяти зменшенню азотемії), зменшують окисний стрес та попереджують мікрозапалення за рахунок покращення антиоксидантного захисту клітин на різних рівнях, що обумовлює нефропротекторні властивості при цукровому діабеті та токсичному ушкодженні нирок хіміопрепаратами.

Спосіб застосування та дози

Вживати дорослим по 1 капсулі тричі на добу, не залежно від прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Тривалість споживання

3 місяці, проте має визначатися лікарем індивідуально з урахуванням характеру та особливостей функціонального стану нирок. За необхідності курс можна повторити. Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем. Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Період вагітності та годування груддю, індивідуальна несприйнятливність компонентів.

Опис

ДУОНЕФРИЛ® містить науково обґрунтовану комбінацію речовин рослинного походження, що володіє нефропротекторними властивостями. ДУОНЕФРИЛ® у поєднанні з традиційними підходами сприяє збереженню і поліпшенню фільтраційної функції нирок, за рахунок збільшення показника швидкості клубочкової фільтрації та гіпоазотемічній дії при хронічній хворобі нирок на фоні цукрового діабету, гіпертонічної хвороби та інших ураженнях. Екстракт леспедези головчатої (*Lespedeza capitata*) отримують з рослини родини бобових, що походить з північно-східної Америки. Біологічно активними компонентами екстракту є проантоціанідини та флавоноїди, зокрема леспедезин, добре відомий природний компонент із сечогінними та нефропротекторними властивостями. Екстракт леспедези може застосовуватись при нирковій недостатності, зокрема особами із захворюваннями серця та/або ожирінням, через нормоліпідемічні, гіпоазотемічні та діуретичні властивості. Флавоноїди леспедези характеризуються потужними антиоксидантними властивостями, які реалізується в тканинах нирки шляхом запобігання розвитку мікрозапалення ниркових клубочків. Силімарін є флаволігнаном, що отримують з розторопші плямистої *Silybum marianum*. Розторопша та її флавоноїди є одними з найбільш широко використовуваних нутріцевтиків у Сполучених Штатах та Європі з величезною доказовою базою та широким профілем безпеки. За рахунок потужної антиоксидантної дії силімарін сприяє підвищенню рівня двох додаткових антиоксидантів, глутатіону та супероксиддисмутази, в тому числі у нирковій тканині. Силімарин концентрується в клітинах нирок, де він сприяє відновленню та регенерації, шляхом збільшення синтезу білка та нуклеїнових кислот. У рандомізованому контрольованому дослідженні було також встановлено, що він ефективний у зниженні протеїнурії у пацієнтів з діабетом 2 типу з нефропатією. Зниження протеїнурії було пов'язане з антиоксидантною та протизапальною дією силімарину. Силімарин має позитивний вплив на запобігання або зменшення тяжкості нефротоксичності цисплатину.

Форма випуску

капсули з масою вмісту 650 мг (mg) $\pm$ 7,5 %.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури від 4 °C до 25 °C.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення