

Опис

діючі речовини: папаїн, лізоцим.

допоміжні речовини: хлорид натрію, D(+) - лактози моногідрат.

Протеолітична активність 400 ПО/фл

Властивості

Папаїн (протеолітичний фермент) і **Лізоцим** (муколітичний фермент) – природні ферменти рослинного походження, отримані з молочного соку папаї (Carica Papaya). Папаїн має протеолітичну дію, здатний розщеплювати некротизовані тканини. Проникаючи через шкіру під дією електрофорезу і накопичуючись в зоні ураження міжхребцевого диска, ферменти впливають на міжхребцеву грижу, яка починає поступово розм'якшуватися і зменшуватися в розмірах. Цього буває достатньо, щоб звільнити нервове закінчення, яке вона затискає, і біль поступово зникає. Також папаїн має протизапальний та протиабляковий ефекти, діє на весь пошкоджений міжхребцевий диск, посилюючи регенерацію хрящових тканин. Папаїн підвищує секрецію колагенового білка, що призводить до фіброзу міжхребцевого диску і стабілізації опорно-рухового сегменту.

Рекомендації щодо застосування

Сухий бальзам для тіла „**КАРІПАІН**” рекомендується застосовувати як додатковий засіб для комплексної терапії міжхребцевих гриж, протрузій, остеохондрозу хребта, дискового радикуліту, плече-лопаткового періартриту, артритів, артрозів, посттравматичних контрактур. Також використовується при келоїдних рубцях різноманітного походження, спайкових процесах.

Спосіб застосування

Каріпаїн вводиться методом електрофорезу з позитивного полюсу. Один флакон використовується на одну процедуру. У розведеному вигляді не зберігається.

Вміст флакону Каріпаїн розводиться у 5-10 мл фізіологічного розчину безпосередньо перед процедурою. У приготований розчин додається 2-3 краплі Димексиду. Розчин наноситься на фільтрувальний папір білого кольору, розміщений на багаторазовій фланелевій прокладці позитивного електроду. Розмір електроду-прокладки - 10x15 см. На прокладку негативного електроду наноситься розчин еуфіліну. Температура прокладок - 36-39 ° С. Сила струму до

10-15 мА (на початку кожної процедури збільшується поступово). Час експозиції від 10 до 20 хвилин (збільшується поступово).

Застосування курсове - від 1 до 3 курсів, по 20-30 днів кожен, щодня (можливі перерви між процедурами в 1-2 дні)

Інтервал між курсами 1-2 місяці.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів сухого бальзаму (алергічні реакції).

Не застосовувати при гострих запальніх процесах у тканинах.

Форма випуску

Флакони 1 г місткістю по 10 мл. По 10 флаконів в картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищенному від світла місці при температурі від 0 до +25 °C.

Термін зберігання - 24 місяці.

Дата виготовлення (серія) вказана на етикетці флакону.

Виробник

Виготовлено в Україні.

АТ „Київмедпрепарат”, м. Київ, вул. Саксаганського 139

Адреса потужностей виробництва: м.Київ вул.Жилянська 142.

для ТОВ „МЕДВЕЙВ”, 03028, м. Київ, пров.Феодосійський б.14 кв.73