

Склад

100 г розчину містять:

2-пропанол - 45 г, 1-пропанол - 30 г, мецетроній етилсульфат (INN) - 0,2 г, добавки для догляду за шкірою.

Властивості

- Широкий спектр антимікробної дії;
- швидкодіючий препарат з пролонгованою дією протягом 1 години на незахищеній шкірі рук та протягом 3-х годин під медичними рукавичками;
- ефективний проти резидентної мікрофлори;
- зниження транзиторної флори більш ніж на 99,99% за 30 секунд;
- атестований за європейськими стандартами prEN 12791, EN 1500, EN 13727, EN 12054;
- виключно хороша переносимість шкірою навіть при довготривалому застосуванні;
- відмінні захист і догляд за шкірою;
- антисептика рук може проводитися в будь-якому місці, незалежно від наявності рукомийника і води.

Рекомендації щодо застосування

Застосовується для гігієнічної та хірургічної (передопераційна антисептика) антисептики рук та антисептичної обробки шкіри перед ін'єкціями та пункціями, в різних областях медицини і в побуті:

- в лікувальних установах і лікарській практиці всіх профілів;
- у функціональних відділеннях (операційні, відділення інтенсивної терапії, інфекційних лікарнях);
- в амбулаторіях і лабораторіях;
- при домашньому догляді за хворими, літніми людьми і немовлятами;

- у промисловості (фармацевтичне, косметичне, мікробіологічне виробництво, виробництво продуктів харчування);
- в дитячих дошкільних установах, в закладах громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, комунальних об'єктах і т. д.

Спосіб застосування

Стерилліум® класик пур - готовий для застосування препарат. Його втирають нерозбавленим в суху шкіру рук. Необхідно стежити за тим, щоб руки залишалися зволженими препаратом протягом усього часу експозиції. Щоб досягти необхідного ефекту при хірургічній антисептиці рук необхідно втерати препарат порціями по 1,5 - 3 мл. Для більшої зручності при цьому слід користуватися дозатором, який при приведенні його в дію за допомогою важеля видає від 1,5 до 3 мл розчину (залежно від настройки дозатора).

Відповідно до Європейського стандарту EN1500 і Переліку Німецького товариства гігієни та мікробіології (VAH) час обробки для гігієнічної антисептики рук становить 30 с. Об'єм препарату - мінімум 3 мл. Для профілактики Твс процедуру необхідно повторити двічі.

Час обробки для хірургічної антисептики рук відповідно до Європейського стандарту EN1500 і Переліку Німецького товариства гігієни та мікробіології (VAH) становить 1,5 хв.