

Склад

Аскорбінова кислота - 50 mg (мг), рутозид - 50 mg (мг), екстракт бромелайна - 45 mg (мг), серратопептидаза - 10 mg (мг); допоміжні речовини: мкц, крохмаль.

Рекомендації щодо застосування

Дієтична добавка до раціону харчування – додаткове джерело вітамінів групи Р, С, природніх протеолітичних ферментів та фітоекстрактів, що володіють широким спектром дій. Виявляє протизапальну, імуномодулюючу, фібринолітичну, антиоксидантну, протинабрякову та антиагрегантну дії, покращує мікроциркуляцію в тканинах. Сприяє загальному зміцненню організму, підвищенню імунітету, добре проникає у вогнище хронічного запалення та покращує проникнення й активність антибіотиків, лізує некротизовані тканини та продукти їх розпаду, зменшує набряк, гіперемію. При запальних захворюваннях жіночих статевих органів, молочних залоз, застої у молочних залозах, гематомі усуває запалення, набряк, попереджає створення фіброзу, покращує кровообіг, укріплює кровоносні судини, зменшує біль. Впливає на відновлення кістково-хрящової структури за рахунок поліпшення мінерального обміну. Добавку корисно вживати для покращення функціонування репродуктивної, опорно-рухової та кровоносної систем, захворюваннях ЛОР-органів, органів дихання, молочних залоз та стану шкіри, при підвищеному фізичному навантаженні та вікових змінах.

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування

Дітям віком від 12 років та дорослим, по 1 капсулі 2-3 рази на день під час вживання їжі, протягом 3-4 тижнів. Термін та дози може бути змінено за призначенням лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Перед застосуванням необхідна консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого з компонентів. Застосування під час вагітності та годування груддю тільки після консультації лікаря. Діти до 12 років.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника, в сухому приміщенні за температури від 0°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше ніж 75 %. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки з дати виробництва. Не слід використовувати після закінчення терміну придатності.

Упаковка

12 капсул по 380 мг (мг) \pm 7,5% в блістері, по 3-12 блістерів в картонній коробці

Не є лікарським засобом

Виробник

Виробник, оператор ринку відповідальний за маркування: ПП «МСК-МЕД», Україна, 04060, м. Київ, вул. Подвойського, 11-А, кв. 11.

Адреса виробничих потужностей: Київська обл., смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 215

ТУ У 10.8-38321787-001:2016

Замовник та ексклюзивний дистриб'ютор: **ТОВ «ЕВОКЕАР»**, Україна, **01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 74Б, офіс 11**