

## **Склад**

Колоїдний розчин срібла 45-55 ppm (45-55 мг/л (mg/l))

## **Опис**

Прозорий безбарвний розчин, 50 мл (ml) у флаконі із пластику з контролем першого відкриття у комплекті з гортанним розпилювачем та інструкцією із застосування медичного виробу, у картонній коробці.

## **Властивості**

Колоїдне срібло має широкий спектр антибак-теріальної, противірусної та протигрибкової активності, тому пригнічує зростання та сприяє за-гибелі багатьох бактерій на слизовій оболонці горла.

Бактерицидна дія на *Staphylococcus aureus* відмічається при концентрації наночасток колоїдного срібла 45-50 ppm.

При місцевому застосуванні колоїдний роз-чин срібла має тимчасову передбачувану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці горла та ротової порожнини, але не впливає на функції органів та систем організму.

Колоїде срібло працює шляхом зв'язування з білками, які можуть виробляти бактерії та віруси та руйнувати їх, може мати віруліцидну дію щодо вірусу грипу та інших вірусів, а також в'яжучу дію.

## **Рекомендації до вживання**

Антибактеріальний противірусний засіб. Для полегшення перебігу хвороб горла: тонзиліт, фарингіт, ларингіт, стоматит, інфекції, спричинені вірусами та грибами.

## **Застереження**

Не допускати потрапляння розчину в очі. При випадковому потрапленні в очі промити великою кількістю проточної води. Перед застосуванням невелику кількість засобу нанести на шкіру в ділянці ліктьового згину для виявлення можливої індивідуальної непереносимості. При виникненні симптомів індивідуальної непереносимості (подразнення, печіння, свербіж шкіри) промити місце нанесення великою кількістю води, відмовитися від застосування виробу і при необхідності звернутися до лікаря. Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним контейнером кільком особам.

Дотримуйтеся рекомендованих доз і способу застосування виробу.

Колоїдний розчин срібла може спричинити подразнення слизової оболонки горла, особливо при довготривалому застосуванні.

Розчин не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки не має достатньо даних щодо застосування срібловмісних засобів у ці періоди.

Тільки для місцевого застосування.

### **Спосіб застосування**

Відгвинтити ковпачок у флаконі.

Замінити ковпачок на розпилювач, що додається. Струснути флакон.

Перевести сопло розпилювача в горизонтальне положення та провести 2-3 контрольні розпилення у повітря подалі від очей. Розпилення у порожнину рота та глотки проводити при вертикальному положенні голови.

- дорослим та дітям від 12 років по 2 розпилення 3 разів на добу;
- дітям від 4 до 12 років по 1 розпилення 3 рази на добу після консультації з лікарем.

Курс застосування 5-10 днів або за рекомендацією лікаря. Дітям застосовувати засіб тільки під наглядом дорослих.

### **Термін придатності**

3 роки з дати виготовлення.

Термін придатності розчину після першого відкриття флакона – не більше 4 тижнів.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не нижче 5 °С та не вище 25 °С у захищеному від дії прямого сонячного світла та недоступному для дітей місці.