

## **Склад**

*діюча речовина:* етанол;

не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також вода.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

**Код АТХ D08A X08.**

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфекційну, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

## **Показання**

Для дезінфекції шкіри рук.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість.

Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

Дитячий вік до 14 років.

## **Особливі заходи безпеки**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

## **Особливості щодо застосування**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

## **Спосіб застосування та дози**

Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовують дітям віком до 14 років.

## **Передозування**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

## **Побічні ефекти**

При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

5 років.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Березти від вогню.

### **Упаковка**

По 50 мл у флаконах скляних, укуповених пробками та кришками; у флаконах полімерних, укуповених пробками-крапельницями та кришками з контролем першого розкриття; у флаконах полімерних, укуповених кришками з контролем першого розкриття. По 100 мл у флаконах скляних, укуповених пробками та кришками або алюмінієвими кришками; у флаконах полімерних, укуповених кришками з контролем першого розкриття. По 200 мл у банках скляних або флаконах полімерних, укуповених кришками з контролем першого розкриття. По 0,5 л або по 1 л, або по 2 л, або по 5 л, або по 10 л, або по 20 л у каністрах, укуповених кришками (для використання у медичних закладах).

### **Категорія відпуску**

За рецептом.

### **Виробник**

Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.