

Склад

діюча речовина: етанол;

не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також вода.

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

Фармакотерапевтична група

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТХ D08A X08.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфекційну, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

Фармакокінетика.

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Показання

Для дезінфекції шкіри рук.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість.

Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

Дитячий вік до 14 років.

Особливі заходи безпеки

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

Особливості щодо застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

Діти.

Не застосовують дітям віком до 14 років.

Передозування

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

Побічні ефекти

При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Березти від вогню.

Упаковка

По 50 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками; у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями та кришками з контролем першого розкриття; у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття. По 100 мл у флаконах скляних, укупорених пробками та кришками або алюмінієвими кришками; у флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття. По 200 мл у банках скляних або флаконах полімерних, укупорених кришками з контролем першого розкриття. По 0,5 л або по 1 л, або по 2 л, або по 5 л, або по 10 л, або по 20 л у каністрах, укупорених кришками (для використання у медичних закладах).

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Приватне акціонерне товариство фармацевтична фабрика «Віола».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.