

## **Склад**

*діючі речовини:* 1 мл препарату містить олії м'яти перцевої (в перерахуванні на 50 % ментол) 31 мг, камфори рацемічної 64 мг, настойки валеріани коренів (*Valerianaе radix*) (1 : 5) (екстрагент – етанол 70 %) до 1 мл;

1 мл препарату містить 46 крапель.

## **Лікарська форма**

Краплі.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора рідина від жовтуватого до червонувато-бурого кольору, ароматного запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби для місцевого застосування в стоматології. Код АТХ А01А D11.

## **Фармакодинаміка**

Препарат чинить помірну знеболювальну, антисептичну та освіжаючу дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.

## **Показання**

Симптоматичне лікування зубного болю різної етіології.

## **Протипоказання**

Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату, епілепсія, схильність до судомних нападів, бронхіальна астма; уникати контакту з ушкодженою слизовою оболонкою.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Відсутня інформація про можливі взаємодії.

## **Особливості застосування**

У разі появи небажаних алергічних реакцій слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць застосування.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Оскільки до складу препарату входить етанол, при застосуванні слід утримуватися від керування автотранспортом і потенційно небезпечних видів діяльності через можливі побічні реакції (запаморочення, сонливість).

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Оскільки до складу препарату входить етиловий спирт, краплі не рекомендується застосовувати жінкам в період вагітності і годування груддю.

## **Спосіб застосування та дози**

Для заспокоєння зубного болю до хворого зуба прикладають ватний тампон, змочений 2-3 краплями препарату.

*Краплі не ковтати!*

## **Діти**

Краплі не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років.

## **Передозування**

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних ефектів.

При випадковому потраплянні внутрішньо можливі: тяжкі прояви з боку шлунково-кишкового тракту, біль у животі, нудота, блювання, діарея, ректальні виразки, симптоми пригнічення центральної нервової системи, запаморочення, атаксія, судоми, втрата свідомості, припливи, сонливість, утруднення дихання, головний біль, збудження, порушення діяльності серця, зниження артеріального тиску.

Лікування симптоматичне.

## **Побічні реакції**

### *Реакції з боку імунної системи*

Іноді можуть виникати алергічні реакції, у тому числі висипи на шкірі, кропив'янка, свербіж, еритема, анафілактичний шок.

### *З боку центральної нервової системи*

Головний біль, запаморочення, сонливість, атаксія, тремор, судоми, збудження.

### *З боку серцево-судинної системи*

Брадикардія.

### *З боку дихальної системи*

Бронхоспазм.

### *Реакція у місці введення*

Подразнення слизової оболонки, відчуття печіння.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 10 мл у флаконах.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).