

Опис

АРГЕТТ Знеболюючий пластир з Лідокаїном призначений для місцевого застосування.

АРГЕТТ Знеболюючий пластир з Лідокаїном за рахунок еластичної властивості основи призначений для фіксації ураженої ділянки м'язу або суглобу. Ментол 1% охолоджує пошкоджену ділянку суглоба або м'яза, а лідокаїн 4% сприяє тимчасовому полегшенню болю в місці ураження.

АРГЕТТ Знеболюючий пластир з Лідокаїном. Застосована технологія гідрогелевого нанесення на пластир ментолу та лідокаїну для максимального тимчасового полегшенню болю в спині, шиї, кінцівках, м'язах та суглобах.

Компоненти пластиру - ментол 1% та лідокаїн 4% вивільняються з гідрогелевої основи та проникають через шкіру і надають тимчасову безпечну дію при запаленнях суглобів, м'язів, зв'язок, сухожилів, викликаних травмою, при розтягненнях, вивихах, синцях, невралгіях (запаленнях нервових закінчень), міалгіях (запаленнях м'язів).

Органічна речовина *Ментол 1%* - має охолоджуючу, антисептичну та анестезуючу дію. Знеболювальною дією ментолу передують відчуття холоду, легке печіння і поколювання. Профіль дії ментолу зумовлений рефлекторною реакцією шкіри у відповідь на подразнення її рецепторів.

Активна речовина *Лідокаїн 4%* використовується для тимчасового полегшення болю в різних частинах тіла, спричиненого травмою або запальним процесом. Профіль дії лідокаїну, як місцевої анестетики, характеризується швидким початком.

Показання

Для фіксації ураженої ділянки м'язу або суглобу, а також - тимчасового (до 12 годин) полегшення гострого та хронічного болю. При запаленнях суглобів, м'язів, зв'язок, сухожилів, викликаних травмою, розтягненнях, вивихах, синцях, невралгіях (запаленнях нервових закінчень), міалгіях (запаленнях м'язів) у дорослих та дітей віком від 12 років.

Склад

Компоненти: лідокаїн 4% (2.91 mg/cm² (мг/см²)), ментол 1% (0.72 mg/cm² (мг/см²));

Допоміжні інгредієнти: гліцинат алюмінію, гліцерин, каолін, метилпарабен, поліакрилова кислота, полісорбат 80, пропіленгліколь, пропілпарабен, повідон, поліакрилат натрію, винна кислота, діоксид титану, очищена вода.

Спосіб застосування

Тільки для зовнішнього застосування. Очистити і просушити шкіру у місці болю та накласти пластир, попередньо звільнивши від захисної плівки. Час використання одного пластиру зазвичай становить 12 годин. Застосовують по 1 пластиру 2 рази на добу вранці та ввечері.

Схема нанесення:

1. Зняти прозору захисну плівку з пластира.
2. Накласти пластир на уражену ділянку за призначенням.
3. Розгладити для запобігання утворення складок та потрапляння повітря під пластир.

Застереження

Медичний виріб не призначено для застосування всередину. Не застосовувати на ділянках шкіри з густим волоссям. Не допускати контакту поверхні пластиру з очима, слизовими оболонками.

Припинити використання пластиру і звернутися до лікаря слід: у разі погіршення стану шкіри (поява висипу, свербіж або сильне подразнення шкіри), при збереженні болю протягом **3 днів або повторній появі симптомів після нетривалого поліпшення стану.**

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових пластиру. Інгредієнти пластиру не потрапляють у системний кровотік, але не рекомендовано застосовувати при виразці шлунка або 12-палої кишки, при шлунково-кишкових кровотечах, при бронхіальній астмі в анамнезі, при серцевій недостатності, важких формах печінкової та ниркової недостатності, вагітним жінкам та жінкам у період лактації, дітям до 12 років.

Не застосовувати на відкритих ранах або ділянках шкіри з патологічними змінами, такими як екзема, акне, дерматити, запалення або інфекції різного походження.

АРГЕТТ Знеболюючий пластир з Лідокаїном слід використовувати з обережністю при тяжкій серцевій, нирковій та печінковій недостатності.

Побічні ефекти

Пластир містить пропіленгліколь, який може спричинити подразнення шкіри. Він також містить метилпарабен і пропілпарабен, які можуть викликати алергічні реакції, і ці ефекти можуть бути відстроченими. Один з метаболітів лідокаїну, 2,6-ксилідин, виявився генотоксичним і канцерогенним для щурів. Також було показано, що вторинні метаболіти мають мутагенну дію. Клінічне значення цього невідоме, і

тому ефективність може бути виправдана лише у тому випадку, якщо є терапевтична користь для пацієнта.

Упаковка

По 1 пластиру розміром (10 cm (cm) × 15 cm (cm)) у саше, 3 саше в картонній коробці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, у захищеному від світла, сухому та недоступному для дітей місці. Після першого відкриття саше використовувати пластир протягом одного місяця.

Термін придатності

3 роки.

Виробник

Виробник: Delta Medical Promotions AG, 26 Oetenbachgasse, Zurich, CH-8001, Switzerland/Дельта Медікел Промоушнз АГ, Отенбахгассе 26, Цюрих, CH-8001, Швейцарія. www.deltaswiss.eu. Виробнича ділянка: Planet (Anhui) Medical Products Co., Ltd., No. 2066 West Jianshe Road, Hi-tech Zone, 239300 Chuzhou City, Anhui, China/Планет (Аньхой) Медікал Продактс Ко., Лтд., № 2066 Вест Джінше Роуд, Хай-тек Зон, 239300 Сужоу Сіті, Аньхой, Китай.

Уповноважений представник в Україні: Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ», м. Вишневе, вул. Чорновола, 43, 08132