

## **Склад**

1 супозиторій містить: гліцерину – 1600 мг; допоміжні речовини: натрію стеарат; макрогол 400.

## **Властивості**

Гліцеринові супозиторії призначені для використання у дорослих у якості послаблюючого засобу при запорах різного генезу.

Гліцерин має подразнювальну дію, що при введенні ректально (у пряму кишку) чинить легку подразнювальну дію на слизову оболонку і стимулює перистальтику та дефекацію. При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв, полегшує виведення калових мас. Гліцерин, розм'якшує калові маси та полегшує їх просування по кишечнику, та виведення.

## **Показання до використання**

Епізодичні запори. Випадки, що потребують очищення товстого кишечника, наприклад перед хірургічним втручанням на товстому кишечнику, перед рентгенологічним обстеженням товстого кишечника тощо.

## **Спосіб застосування та дози**

Гліцеринові супозиторії тільки для ректального застосування.

Необхідно дотримуватися наведених нижче рекомендацій, якщо лікар не дав інших вказівок.

Дорослим та дітям старше 5 років — 1 супозиторій 1 раз на добу.

Пацієнти з нирковою недостатністю.

Не застосовувати пацієнтам із клінічно значущим порушенням функції нирок.

Порядок введення супозиторіїв: супозиторій вводять у пряму кишку і тримають там протягом не менше 5 хв, якщо не відбувається випорожнення раніше. Залишки супозиторіїв виводяться з організму разом із каловими масами.

За необхідності дозу можна збільшити до 2 супозиторіїв на добу.

Якщо позиву до дефекації протягом вказаного часу немає, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Діти: не застосовують дітям віком до 5 років.

## **Побічні ефекти**

Описано деякі наслідки та симптоми, що зникають після завершення застосування, зокрема ректальний дискомфорт, подразнення, печіння, коліки та спазми. Крім того, у рідкісних випадках може спричиняти гіперемію слизової оболонки прямої кишки, а у поодиноких випадках — невеликі кровотечі або виділення слизу.

Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання, шлунково-кишкова кровотеча.

При тривалому застосуванні спостерігається подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді — катаральний проктит.

## **Протипоказання**

- Підвищена чутливість до діючих речовин або до будь-якої іншої речовини, що входить до складу.
- кишкова непрохідність, ниркова недостатність, апендицит, кровотечі, діарея, геморой в стадії загострення, тріщини заднього проходу, запальні захворювання, пухлини прямої кишки, недіагностований біль у животі, геморагічний ректоколіт.

Медичний виріб може взаємодіяти з іншими лікарськими засобами. Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших ліків, які застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількохгодинного інтервалу.

## **Застереження**

- Тільки для ректального використання. Не можна ковтати в середину.
- свічки призначені для тимчасового використання менше 60 хвилин.
- не рекомендується застосовувати супозиторії курсом більше 1 тижня.
- з обережністю застосовувати при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні.
- перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

## **Форма випуску**

По 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці.

## **Термін придатності**

2 роки. Дата кінцевого терміну використання вказана на коробці.

### **Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

### **Виробник**

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул.  
Корольова, б.4.

Замовник: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», 79052, Україна, м. Львів,  
вул. Широка, 66