

Склад

діюча речовина: скипидар живичний;

1 г мазі містить: скипидару живичного 200 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, емульгатор Т-2, вода очищена.

Лікарська форма

Мазь.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору із запахом скипидару. За зовнішнім виглядом мазь має бути однорідною.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ M02A X10.

Фармакодинаміка

Скипидарна мазь чинить відволікаючу, протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію. Відволікаюча дія пов'язана зі здатністю проникати через епідерміс і спричиняти рефлекторні зміни внаслідок подразнення рецепторів шкіри.

Показання

У комплексному лікуванні невралгій, міозитів, артритів.

Протипоказання

Тяжкі захворювання нирок і печінки, захворювання шкіри різного характеру, підвищена чутливість до препарату.

Особливі заходи безпеки.

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі! Якщо мазь випадково потрапила в очі, слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

Не наносити на ушкоджені ділянки шкіри.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Скипидарна мазь хімічно несумісна з розчином йоду.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Слід дотримуватися обережності під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, зважаючи на виникнення можливих побічних реакцій генералізованого характеру (див. "Побічні реакції").

Застосування у період вагітності або годування груддю

Невідомо, чи проникає препарат у грудне молоко та чи проходить через плацентарний бар'єр при вагітності, тому застосування препарату в період вагітності та годування груддю протипоказане.

Спосіб застосування та дози

Скипидарну мазь застосовують дорослим зовнішньо для розтирання болючих ділянок 2-3 рази на день. Тривалість застосування обумовлена перебігом захворювання та досягнутим ефектом.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти

Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому мазь не рекомендується для застосування дітям.

Передозування

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних явищ.

Побічні реакції

Реакції з боку імунної системи: при підвищеній чутливості до препарату можуть з'явитися алергічні реакції місцевого характеру, в тому числі, свербіж, набряк, почервоніння шкіри, печіння, висип. В окремих випадках можуть з'явитися алергічні реакції генералізованого характеру, в тому числі ядуха прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску, запаморочення, судоми, втрата свідомості.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 г у тубах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).