

## **Склад**

*діюча речовина:* скипидар живичний;

1 г мазі містить: скипидару живичного 200 мг;

*допоміжні речовини:* парафін білий м'який, емульгатор Т-2, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Мазь.

*Основні фізико-хімічні властивості:* мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору із запахом скипидару. За зовнішнім виглядом мазь має бути однорідною.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ M02A X10.

## **Фармакодинаміка**

Скипидарна мазь чинить відволікаючу, протизапальну, антисептичну та знеболювальну дію. Відволікаюча дія пов'язана зі здатністю проникати через епідерміс і спричиняти рефлекторні зміни внаслідок подразнення рецепторів шкіри.

## **Показання**

У комплексному лікуванні невралгій, міозитів, артритів.

## **Протипоказання**

Тяжкі захворювання нирок і печінки, захворювання шкіри різного характеру, підвищена чутливість до препарату.

### Особливі заходи безпеки.

Не допускати потрапляння мазі на слизові оболонки та в очі! Якщо мазь випадково потрапила в очі, слід ретельно промити їх великою кількістю проточної води.

Не наносити на ушкоджені ділянки шкіри.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Скипидарна мазь хімічно несумісна з розчином йоду.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Слід дотримуватися обережності під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, зважаючи на виникнення можливих побічних реакцій генералізованого характеру (див. "Побічні реакції").

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Невідомо, чи проникає препарат у грудне молоко та чи проходить через плацентарний бар'єр при вагітності, тому застосування препарату в період вагітності та годування груддю протипоказане.

## **Спосіб застосування та дози**

Скипидарну мазь застосовують дорослим зовнішньо для розтирання болючих ділянок 2-3 рази на день. Тривалість застосування обумовлена перебігом захворювання та досягнутим ефектом.

Користувач повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

## **Діти**

Досвід застосування препарату дітям відсутній, тому мазь не рекомендується для застосування дітям.

## **Передозування**

Можливий розвиток підвищеної чутливості до препарату, посилення побічних явищ.

## **Побічні реакції**

*Реакції з боку імунної системи:* при підвищеній чутливості до препарату можуть з'явитися алергічні реакції місцевого характеру, в тому числі, свербіж, набряк, почервоніння шкіри, печіння, висип. В окремих випадках можуть з'явитися алергічні реакції генералізованого характеру, в тому числі ядуха прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску, запаморочення, судоми, втрата свідомості.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 30 г у тубах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).