

## **Склад**

*Спирт етиловий денатурований – 70 %, суміш четвертинних амонійних сполук – 0,11 % – діючі речовини;*

*допоміжні речовини: вода підготовлена, гліцерин, пантенол, ароматизатор.*

## **Рекомендації щодо застосування**

**Гігієнічна обробка рук:** 3 мл засобу наносять на сухі долоні рук і втирають у шкіру за стандартною методикою до висихання, але не менше 15 секунд.

**Хірургічна дезінфекція рук:** на чисті сухі руки й передпліччя 2-ма порціями наносять 5-6 мл засобу протягом 1,5 хвилини за технікою хірургічної обробки, підтримуючи шкіру рук у вологому стані.

**Обробка шкіри операційного, ін'єкційного поля, ліктювих згинів донорів** : поверхню шкіри, що потребує обробки повністю змочують засобом.

**Профілактична обробка шкірних покривів ніг:** засіб наносять на оброблювану поверхню.

Експрес дезінфекція поверхонь, виробів медичного призначення, рукавичок: проводиться у випадках нагальної потреби методом протирання або зрошення.

Засіб не потребує змивання. Експозиція – 15 секунд.

## **Умови зберігання**

Зберігати в упаковці виробника, захищеному від світла місці, окремо від ліків, у недоступних для дітей місцях за температури від мінус 40 °С до плюс 35 °С, подалі від нагрівальних приладів та відкритого вогню.

## **Застереження**

Використовувати тільки для зовнішнього застосування.

Не наносити на рани та слизові оболонки.

Запобігати потраплянню в очі.

При попаданні засобу в очі необхідно промити їх великою кількістю проточної води.