

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять: Rhus toxicodendron 1000CH 20 мг, Bryonia alba 200CH 20 мг, Causticum 1000CH 20 мг, Ledum 200CH 20 мг, Rhododendron 50CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* цукор кондитерський.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули, розчинні у воді, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.* Полегшує біль, набряклість, скутість рухів у суглобах, сприяє нормалізації мінерального обміну, поліпшує кровопостачання тканин.

## **Показання**

У комплексному лікуванні: біль у суглобах, артрити, артрози, ревматоїдний поліартрит, подагра. Розтягнення м'язів і зв'язок. Корінцеві болі, попереково-крижовий радикуліт.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

Можливе сумісне застосування з будь-якими методами лікування та лікарськими засобами (у тому числі антибіотиками, протизапальними засобами, вітамінами). Інтервал між їх прийомами має становити не менше 30 хв.

## **Особливості щодо застосування**

Пацієнтам з рідкісною вродженою непереносимістю фруктози, синдромом мальабсорбції глюкози-галактози або дефіцитом сахарази-ізомальтази не слід застосовувати цей лікарський засіб.

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – цукру кондитерського – проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Застосування лікарського засобу у період вагітності і годування груддю не досліджувалось. Питання про доцільність застосування лікарського засобу вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.


### **Спосіб застосування та дози**

Дорослим та дітям віком від 12 років – по 5 гранул під язик до повного розсмоктування; дітям віком від 3 до 12 років – по 3 гранули на 1 прийом, розчинені в невеликій кількості води або під язик. Гранули слід приймати за 15-20 хвилин до їди або через 1 годину після їди.

Приймати 1-3 рази на добу, залежно від інтенсивності больового синдрому.

При зменшенні болю лікарський засіб приймати 2-3 рази на тиждень. Курс лікування – 3-4 місяці. За необхідності курс повторити через 2-3 тижні.

#### Як користуватись контейнером з дозуванням



1. Візьміть контейнер ковпачком донизу.



2. Повертайте вправо або вліво, доки в ковпачок потрапить потрібна кількість гранул.



3. Зніміть ковпачок з гранулами та використовуйте його, щоб насипати гранули під язик.

*Діти.*

Не призначають дітям віком до 3 років.

### **Передозування**

У більшості випадків не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії, але у осіб з гіперчутливістю до компонентів лікарського засобу можливе посилення проявів побічних реакцій.

### **Побічні ефекти**

Можливі реакції гіперчутливості.

### **Термін придатності**

3 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25°C.

### **Упаковка**

По 10 г гранул у пеналі полімерному, по 1 пеналу в пачці з картону; або по 10 г гранул у флаконі з кришкою, по 1 флакону в пачці з картону; або по 5 г гранул у контейнері з дозуванням, по 2 контейнери в пачці з картону.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

### **Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

### **Місцезнаходження заявника.**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, будинок 76-78.