

Склад

діюча речовина: настойка глоду плодів;

1 мл препарату містить настойки глоду плодів (*Crataegi fructus*) (1:10)
(екстрагент — етанол 70 %).

Лікарська форма

Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовто-червоного до червонувато-бурого кольору, гіркувата на смак, із слабким ароматним запахом; допускається утворення осаду при зберіганні.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТХ C01E B04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини, що містяться у глоду плодах (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти), посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що приводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Фармакокінетика.

Лікарський засіб добре всмоктується при прийомі всередину. Ефект настає через 30 хв — 1 годину.

Показання

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія); як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Лікарський засіб посилює дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. Може посилювати дію снодійних, седативних і гіпотензивних засобів.

У разі необхідності одночасного застосування будь-яких лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Особливості щодо застосування

Лікарський засіб не рекомендується приймати під час їди, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Глод-Вішфа є традиційним лікарським засобом рослинного походження для застосування відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Цей лікарський засіб містить 70 об.% етанолу (алкоголю), тобто 690,55 мг/дозу. Шкідливий для пацієнтів, хворих на алкоголізм. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам із захворюваннями печінки та хворим на епілепсію.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Лікарський засіб протипоказано застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Лікарський засіб може спричинити сонливість, тому під час застосування слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати всередину до їди. Дорослим рекомендується застосовувати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям від 12 років — із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально з урахуванням характеру і ступеня тяжкості захворювання.

Необхідно проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні

реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.

Діти.

Лікарський засіб протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування

Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.

Лікування: припинення застосування препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні ефекти

З боку нервової системи: сонливість.

З боку серцево-судинної системи: брадикардія, значне зниження артеріального тиску.

З боку імунної системи: алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, а також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>.

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 мл або 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».