

## **Склад**

*діюча речовина:* ламінарії слані.

## **Лікарська форма**

Слані.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки сланей різної форми, від світло-оливкового до темно-оливкового, зеленувато-коричневого, червонувато-коричневого, темно-сірого із зеленуватим відтінком, зеленувато-чорного кольору, ззовні вкриті білим нальотом солей.

## **Фармакотерапевтична група**

Проносні засоби. Код АТХ А06А С.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, сечогінну, загальнозміцнювальну, протисклеротичну, гіпоглікемічну дію, активно впливають на функцію щитовидної залози, регулюють обмін речовин, сприяють випорожненню кишечника, сприяють виведенню радіонуклідів з організму.

## **Показання**

Хронічні атонічні запори; хронічні ентероколіти, проктити – у складі комплексної терапії; легкі форми дифузного токсичного зобу (базедової хвороби) – у складі комплексної терапії; профілактика ендемічного зобу, атеросклерозу; як додатковий засіб при гіпертиреозі.

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до препаратів йоду. Підвищена чутливість до морської капусти. Схильність до кровотечі, нефрити, геморагічні діатези, фурункульоз, туберкульоз легень.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не встановлена.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не встановлена.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим застосовувати по  $\frac{1}{2}$ -1 чайній ложці морської капусти вранці або ввечері, запиваючи  $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$  склянки води.

При дисфункції щитовидної залози курс лікування становить 15-30 днів, в інших випадках тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Досвід застосування препарату дітям відсутній.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Реакції гіперчутливості. При тривалому застосуванні і підвищеній чутливості до йоду можливі прояви йодизму (нежить, слезотеча, гіперсалівація). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка**

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.