

## **Склад**

*діюча речовина:* етанол;

не менше 69,3 % об/об і не більше 70,7 % об/об етанолу та вода.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

**Код ATX D08A X08.**

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.* При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів.

*Фармакокінетика.* При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

## **Показання**

Фурункули, панариції, інфільтрати, мастити на початкових стадіях. Для обтирання та компресів. Хіургічна обробка рук хіургів.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.

## **Особливі заходи безпеки**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

## **Особливості щодо застосування**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.* Не впливає.

## **Спосіб застосування та дози**

Зовнішньо — для обтирання, компресів, дезінфекції шкіри, у тому числі рук.

Для компресів, обтирань (з метою запобігання опіку) етанол слід розвести водою у співвідношенні 1:1.

## **Діти**

Застосовують за призначенням лікаря.

## **Передозування**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

## **Побічні ефекти**

При місцевому застосуванні можливі подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

5 років.

Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Берегти від вогню.

### **Упаковка**

По 50 мл або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних. По 0,5 л або по 1 л, або по 2 л, або по 5 л, або по 10 л, або по 20 л у каністрах.

### **Категорія відпуску**

За рецептром.

### **Виробник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75.