

Склад

Йодід калію.

Опис

Основна біологічна роль йоду полягає у підтримці функції щитовидної залози та побудові її гормонів - тироксину та трийодтироніну. На сьогоднішній день йод є єдиним відомим мікроелементом, який бере участь у освіті цих гормонів. Фізіологічна роль гормонів щитовидної залози дуже велика: контроль за інтенсивністю основного обміну, вплив на водно-сольовий, жировий та вуглеводний обміни.

Як гормон, тироксин перебуває у постійному зв'язку з іншими залозами внутрішньої секреції, особливо з гіпофізом та статевими залозами, регулює діяльність мозку, нервової та серцево-судинної систем, стимулює ріст та розумовий розвиток дитини.

Дослідження, проведені останніми роками Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у різних країнах світу показали, що рівень розумового розвитку (IQ) безпосередньо пов'язаний із йодом. Гормональні порушення, що виникають через дефіцит йоду, не мають часом зовні вираженого характеру, тому йододефіцит отримав назву «прихований голод». Найбільше від цього голоду страждають діти: затримується зростання, уповільнюється психічний розвиток, іноді навіть розвивається кретинізм, їм все важче вчитися у школі, знижується процес запам'ятовування та освоювання нових знань та навичок.

Нестача йоду як «будівельного елемента» гормону щитовидної залози часто є прихованою причиною розвитку багатьох захворювань.

Показання

Одним з основних способів покриття дефіциту йоду є також вживання в їжу йодовмісних продуктів: молока, яєць, м'яса, морської риби. Але, як правило, вміст йоду в таких продуктах точно не визначено, а при тривалому зберіганні та кулінарній обробці може губитися до 65% мікроелемента.

«Йод-Актив плюс®» - аналог природної сполуки йоду, застосовується у комплексній терапії та для профілактики захворювань щитовидної залози.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів; особам із захворюваннями щитовидної залози; особам, які приймають інші препарати йоду, жінкам у період вагітності та лактації.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям старше 12 років по 1 таблетці 2 рази на день під час їди, запиваючи водою. Курс прийому – 1-2 місяці.

Термін придатності

24 місяці.

Упаковка

40 таблеток у картонній коробці.

Виробник

ТОВ ВТФ «Фармаком», Україна