

## **Склад**

*діюча речовина:* хвоща польового трава (Equiseti arvensis herba);

*1 фільтр-пакет містить:* хвоща польового трави (Equiseti arvensis herba) 1,5 г.

## **Лікарська форма**

Трава.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки стебел та листя від світло-зеленого до зеленувато-сірого кольору, іноді з коричневими краплями.

## **Фармакотерапевтична група**

Діуретичні препарати. Код АТХ С03В Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять сечогінну, кровоспинну, протизапальну, антимікробну і гіпотензивну дію. Експериментально встановлено, що настої з хвоща польового трави сприяють виведенню свинцю з організму.

## **Показання**

Серцеві та інші захворювання, що супроводжуються набряками; захворювання сечовивідних шляхів (пієліти, цистити, уретрити); легеневі, носові, маткові і гемороїдальні кровотечі; гострі та хронічні отруєння свинцем (у складі комплексної терапії).

## **Протипоказання**

Нефрити, нефрози, нефрозо-нефрити. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказано.

## **Спосіб застосування та дози**

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу через 1 годину після їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по ½-1 склянці, дітям віком 12-14 років – по ¼ склянки.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

## **Діти**

Препарат призначати дітям віком від 12 років.

## **Передозування**

Повідомлення відсутні.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж та висипання на шкірі). Може спричинити подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та наприкінці сечовипускання. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

## **Термін придатності**

4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.