

Склад

діюча речовина: діоксотетрагідрокситетрагідронафталін (оксонафтілін, оксолін) – 2,5 мг;

допоміжні речовини: лимонної кислоти моногідрат, вазелін

Лікарська форма

Мазь назальна.

Основні фізико-хімічні властивості: мазь від білого до світло-жовтого кольору. При зберіганні допускається рожевого відтінку.

Фармакотерапевтична група

Противірусний засіб місцевого застосування Код АТХ: J05AX.

Фармакодинаміка

Противірусний засіб для назального застосування. Має противірусну активність щодо вірусу грипу, блокуючи місця зв'язування вірусу з поверхнею клітинної мембрани, перешкоджає репродукції вірусу в клітинах. До дії діоксотетрагідрокситетрагідронафталіну чутливі також віруси Herpes simplex, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного молюска.

Фармакокінетика

При нанесенні на слизову оболонку всмоктується до 20%. В організмі не кумулює і виводиться переважно нирками протягом доби.

Показання

Профілактика грипу, лікування вірусних ринітів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

З обережністю

Вагітність, період лактації, вік до 2 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Випадків взаємодії чи несумісності з іншими лікарськими засобами не виявлено.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Застосування препарату не впливає на керування транспортними засобами, роботу з механізмами та виконання потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій.

Спосіб застосування та дози

Для профілактики грипу - щодня 2-3 рази на день змащують слизову оболонку носа в період підйому та максимального розвитку епідемічного спалаху грипу (протягом 25 днів) або при контакті з хворим на грип.

Лікування вірусного риніту: слизову оболонку носа мазають 2-3 рази у день протягом 3-4 днів.

Передозування

Випадки передозування препарату Оксолін назальна мазь невідомі.

Побічні реакції

Печіння слизової оболонки порожнини носа, ринорея. В окремих випадках можливо синє фарбування слизової оболонки.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці

Упаковка

По 10 в тубі; по 1 тубі у картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ "Нижфарм".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Росія, 603950, м. Нижній Новгород, вул. Салганська, д. 7

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).