

Склад

діючі речовини: Aconitum D3, Gelsemium D3, Ipecacuanha D3, Phosphorus D5, Bryonia D2, Eupatorium perfoliatum D1;

100 г розчину містять Aconitum D3 10 г, Gelsemium D3 10 г, Ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus D5 10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма

Розчин оральний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора, світло-жовта рідина, іноді з зеленим відтінком, із запахом алкоголю, злегка пряним, злегка солодкуватим.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Препарат містить шість активних компонентів, найбільш прийнятних для лікування гострих застудних захворювань верхніх дихальних шляхів і грипу. Засіб швидко зупиняє типові ознаки гострої інфекції дихальних шляхів, такі як гарячка, головний біль, болючість м'язів, а також риніт, фарингіт. Препарат посилює природний захист організму і сприяє швидкому видужанню і відновленню сил після перенесеного захворювання, у такий спосіб зменшує ознаки виснаження (астенічний синдром) або запобігає їм. Застосування препарату при перших проявах захворювання або відразу після контакту з людьми, які захворіли, сприяє запобіганню розвитку захворювання.

Показання

Профілактика і лікування грипозподібних інфекцій, що супроводжуються лихоманкою та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, підтримуюче лікування грипу.

Протипоказання

Через вміст спирту Інфлюцид не можна застосовувати хворим з алкогольною залежністю.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Особливості застосування

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення симптомів захворювання. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат Інфлюцид містить 46 об. % спирту, тому існує підвищений ризик для здоров'я пацієнтів із захворюваннями печінки, хворих на алкоголізм, а також вагітних.

При збереженні високої температури тіла або при її підвищенні до рівня понад 39 оС, при збереженні або нез'ясованості симптоматики, а також при появі нових симптомів слід проконсультуватися з лікарем, оскільки може йти мова про хвороби, які вимагають медичної допомоги.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Інфлюцид у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Спосіб застосування та дози

При гострому захворюванні застосовувати по 10 крапель розчину щогодини (не більше 12 разів на добу) до настання покращення. При подальшому лікуванні – по 10 крапель розчину 3 рази на добу до повного одужання.

Тривалість лікування – 7– 10 днів (до повного зникнення симптомів).

Для профілактики респіраторно-вірусної інфекції рекомендується приймати по 10 крапель розчину 3 рази на добу.

Тривалість застосування після контакту з хворими на респіраторну інфекцію або грип – 1 тиждень.

Розчин приймають за півгодини до їди або через півгодини після їди, потримавши його деякий час у роті перед тим як проковтнути. Дітям віком від 12 років препарат можна розчиняти у невеликій кількості води (наприклад у чайній ложці води).

Діти

Препарат призначають дітям віком від 12 років.

Дітям віком від 1 до 12 років рекомендується застосовувати препарат Інфлюцид в таблетках.

Передозування

У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні реакції

У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи висипання на шкірі, шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання або діарею.

При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 30 мл розчину у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/

Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/

Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).