

## **Склад**

*діючі речовини:* ментол (левоментол), анісова олія, настоянка перцю.

5 мл розчину містять: ментолу (левоментолу) 1,0 мг; анісової олії 0,0035 мл; настоянки перцю 0,025 мл;

*допоміжні речовини:* олія імбиру, олія гвоздика, олія м'яти перцевої, гліцерин, глюкози розчин, сахароза, трагакант, кислота бензойна (Е 210), карамель (Е 150), настоянка бензоїну, толуанський бальзам, етанол 90 %, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Розчин для перорального застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* сироп темно-коричневого кольору з запахом етанолу та ментолу.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.

Код АТХ R05X.

## **Фармакодинаміка**

Комбінований препарат рослинного походження, що застосовується при застудних захворюваннях дихальних шляхів. Препарат проявляє муколітичну, бронхолітичну, відхаркувальну, протизапальну, заспокійливу та потогінну дію.

Ментол чинить спазмолітичну, антисептичну, місцевоанестезуючу дію, сприяє очищенню дихальних шляхів від слизу. Анісова олія має відхаркувальні властивості, спазмолітичну та антибактеріальну дію. Настоянка перцю чинить відволікаючий ефект.

## **Показання**

Симптоматичне лікування інфекційно-запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються болем у горлі, кашлем, нежиттю та запаленням слизових оболонок.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

### Особливі заходи безпеки.

З обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет, тому що препарат у своєму складі містить сахарозу, глюкозу. Не застосовувати пацієнтам із непереносимістю фруктози, глюкози-сахарози, сахарози-ізомальтози.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Взаємодія не описана.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не чинить снодійного ефекту, не впливає на здатність керувати автотранспортом або роботу з іншими механізмами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю після оцінки лікарем співвідношення користь/ризик.

### **Спосіб застосування та дози**

Застосовувати внутрішньо.

*Дорослим та дітям віком від 12 років* – по 2 чайні ложки (10 мл) щогодини або по 3 чайні ложки (15 мл) кожні 2-3 години.

*Дітям віком 6-12 років* – по 1 чайній ложці (5 мл) щогодини або по 2 чайні ложки (10 мл) кожні 2-3 години.

*Дітям віком 3-6 років* – по 1 чайній ложці (5 мл) кожні 2 години.

Перед застосуванням пляшечку струсити.

Не застосовувати більше 6 доз протягом доби. Курс лікування становить 14 днів.

Пацієнтам літнього віку призначати такі ж самі дози, що і для дорослих.

### **Діти**

Протипоказаний дітям віком до 3 років.

## **Передозування**

Випадки передозування не описані.

## **Побічні реакції**

В осіб з індивідуальною непереносимістю будь-якого компонента препарату можливі шлунково-кишкові розлади, реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж.

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

## **Упаковка**

По 100 мл в пляшці, по 1 пляшці в картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Белл Санз & Компані (Драггістс) Лімітед.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Гіффорд Хаус, Слейдберн Кресцент, Саутпорт, PR9 9AL, Велика Британія.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).