

Склад

діюча речовина: глоду листя і квітки (Crataegi folia et flores);

1 пачка містить: глоду листя і квіток (Crataegi folia et flores) 50 г.

Лікарська форма

Листя і квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: порошок крупний: суміш шматочків листя, квіток, бутонів, пелюсток, квітконіжок, тичинок, черешків, гілочок різної форми зеленуватого, червоно-коричневого, коричнювато-червоного або бурувато-червоного, коричневого або сіро-коричневого, від яскраво-зеленого до темно-зеленого, сіро-зеленого, буровато-білого або жовтувато-білого кольору.

Фармакотерапевтична група

Кардіологічні препарати. Код АТХ C01E B04.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини препарату чинять кардіотонічну, спазмолітичну, гіпотензивну і заспокійливу дію; покращують роботу серцевого м'яза, усувають порушення ритму серцевих скорочень, посилюють кровообіг у коронарних судинах серця та судинах головного мозку, нормалізують артеріальний тиск, знижують проникність стінок кровоносних судин і капілярів, сприяють зниженню рівня холестерину в крові.

Показання

Функціональні розлади серцевої діяльності, ангіоневрози, легкі форми аритмій, початкові стадії артеріальної гіпертензії – у складі комплексної терапії.

Протипоказання

Виражені артеріальна гіпотензія і брадикардія; гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Посилює дію снодійних, седативних та антиаритмічних засобів, серцевих глікозидів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

На період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами, оскільки можливе виникнення сонливості.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

1 столову ложку листя і квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді дорослим по $\frac{1}{3}$ склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди, дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 14 років.

Передозування

. При передозуванні виникають сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень, зниження артеріального тиску. При виникненні даних симптомів слід припинити прийом препарату, терапія симптоматична.

Побічні реакції

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При тривалому застосуванні може з'явитися сонливість, зменшення частоти серцевих скорочень.

Термін придатності

3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.