

Склад

діюча речовина: 1 флакон містить настойки плодів глоду (*Crataegi fructus*) (1:10) ((екстрагент – етанол 70 % (об/об)) 100 мл.

Лікарська форма

Настойка для перорального застосування.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина від жовтого до коричневого кольору з оранжувато-червонуватим відтінком. При зберіганні допускається утворення осаду.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТХ C01E B04.

Фармакодинаміка

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду, посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Фармакокінетика

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин – 1 годину.

Показання

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (у тому числі нейроциркуляторна дистонія), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Глоду настойка має потенціювати дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом. Може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів.

Особливості застосування

Препарат не рекомендується приймати під час прийому їжі, щоб уникнути взаємодії з її компонентами.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат містить етиловий спирт та може спричинити сонливість, тому у період застосування препарату слід утриматися від керування автотранспортними засобами або роботи з потенційно небезпечними механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказане.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати внутрішньо до їди. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям від 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного терапевтичного ефекту.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

У разі відсутності пробки-крапельниці для застосування лікарського засобу, закупореного пробкою закупорювальною, використовувати скляну піпетку медичну, при цьому доза застосування не зміниться.

Діти

Дітям віком до 12 років застосування препарату протипоказане.

Передозування

Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.

Лікування: припинення прийому препарату. Терапія симптоматична.

Побічні реакції

Сонливість, значне уповільнення серцевого ритму, алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Термін придатності

4 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

100 мл у флаконі.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Лубнифарм».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Барвінкова, 16.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).