

Склад

діюча речовина: гепарин натрію;

100 г крему містять гепарину натрію 30000 МО або 50000 МО;

допоміжні речовини: алантоїн, декспантенол, динатрію едетат, бронопол, хостафат

KW-340-N, лунацера М, карбомер 934, левоментол, олія мінеральна легка, гліцерол моностеарат, ізопропілмірикат, парафін білий м'який, триетаноламін, вода очищена.

Лікарська форма

Крем.

Основні фізико-хімічні властивості: білого кольору гомогенний крем з характерним запахом ментолу.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються при варикозному розширенні вен. Гепарин або гепариноїди для місцевого застосування. Код АТХ С05В А03.

Фармакодинаміка

Гепатромбін крем – препарат високодозованого антикоагулянту прямої дії гепарину для зовнішнього застосування. Проявляє місцеву антитромботичну, протинабрякову та протизапальну дію, стимулює процеси обміну речовин у тканинах, а також грануляцію та епітелізацію тканин, покращує місцевий кровотік.

Фармакокінетика

При зовнішньому застосуванні гепарин не виявляє системної дії, швидко проникає крізь шкіру та накопичується в роговому шарі епідермісу, і відповідно, має виключно місцеву дію.

Показання

Лікування захворювань поверхневих вен, таких як варикозне розширення вен, і пов'язаних з ними ускладнень; флеботромбоз, тромбофлебіт, поверхневий

перифлебїт. Післяопераційний варикозний флєбїт, ускладнення після хїрургїчного видалення пїдшкїрних вен нижнїх кїнцївок. Травми та забиття, їнфїльтрати та локалїзованї набряки, пїдшкїрнї гематоми. Травми та розтягнення м'язово-сухожильних та капсулозв'язкових структур.

Протипоказання

Пїдвищена чутливїсть до гепарину або до будь-яких їнших компонентїв препарату; трофїчнї виразки нїг, що кровоточать; вїдкритї та/або їнфїкованї рани, геморагїчний дїатез; пурпура; тромбоцитопенїя; гемофїлїя. Схильнїсть до кровотеч.

Взаємодїя з їншими лїкарськими засобами та їншї види взаємодїї

Гепатромбїн не можна застосовувати разом з лїкарськими засобами для мїсцевого застосування, наприклад, з препаратами, що мїстять тетрациклїн, гїдрокортизон, салїцилову кислоту, антикоагулянти.

Застосування гепарину може сприяти подовженню протромбїнового часу у хворих, якї застосовують пероральнї антикоагулянти.

Особливостї застосування

Крем наносити тїльки на неушкоджену шкїру. Препарат не слїд призначати при кровотечах, наносити на їнфїкованї дїлянки шкїри при наявностї гнїйних процесїв, слизовї оболонки. При наявностї у хворого геморагїчних симптомїв слїд ретельно зважити можливїсть застосування препарату.

Крем не можна наносити на мокнучї дїлянки шкїри, рани, виразки та пухирї, очї та на дїлянки навколо очей. У разї випадкового потрапляння крему внутрїшньо у дитини може виникнути нудота або блювання. У такому випадку необхідно зробити промивання шлунка. Терапїя симптоматична.

У разї розладїв згортання кровї крем не рекомендується наносити на великї дїлянки шкїри.

Здатнїсть впливати на швидкїсть реакцїї при керуваннї автотранспортом або їншими механїзмами

Гепатромбїн крем не впливає на здатнїсть впливати на швидкїсть реакцїї при керуваннї автотранспортом або роботї з їншими механїзмами.

Застосування у перїод вагїтностї або годування груддю

У період вагітності або годування груддю препарат можна застосовувати лише короткочасно за умови обґрунтованих показань, якщо очікуваний позитивний ефект для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Спосіб застосування та дози

Застосовувати місцево.

Лікування розпочинати із застосування дози 50 000 МО/100 г, тоді як дозу 30 000 МО/ 100 г застосовувати для продовження лікування.

На уражене місце та навколо нього наносити 1-3 рази на добу шар крему товщиною близько 1 мм і злегка втирати його в шкіру.

При захворюваннях вен можна накласти венозний биндаж.

У випадку лікування флебіту цей лікарський засіб не потрібно втирати в шкіру, а лише наносити на уражене місце шаром товщиною близько 1 мм і перев'язати це місце еластичною пов'язкою.

Тривалість курсу лікування встановлює лікар індивідуально залежно від перебігу хвороби.

Діти

Внаслідок обмеженого досвіду застосування препарат не слід призначати дітям.

Передозування

У зв'язку з незначною системною абсорбцією препарату небезпека передозування при місцевому застосуванні відсутня. У разі випадкового застосування внутрішньо можливі поява нудоти та блювання. Необхідно зробити промивання шлунка, подальше лікування – симптоматичне.

Дію гепарину можна нейтралізувати за допомогою протаміну сульфату.

Побічні реакції

Зазвичай препарат переноситься добре, лише у поодиноких випадках може виникнути легке подразнення шкіри (почервоніння), яке через деякий час спонтанно зникає.

Протягом курсу лікування може розвинути реакція підвищеної чутливості на деякі інгредієнти препарату. До ознак такої підвищеної чутливості належать свербіж, почервоніння, припухлість шкіри, відчуття печіння, шкірні висипання, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, геморагії, іноді – виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні побічні реакції.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

«Хемофарм» АД.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Белградський шлях б/н, 26300, м. Вршац, Сербія.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).