

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 г гелю містить  $\beta$ -есцину 10 мг;

*допоміжні речовини:* метилпарагідроксибензоат (Е 218), натрію гідроксид, карбомери, пропіленгліколь, полоксамер, вода очищена.

## **Лікарська форма**

Гель.

Безбарвний або злегка опалесціючий прозорий гомогенний гель з характерним запахом.

## **Фармакотерапевтична група**

Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Код АТС С05С Х03.

## **Фармакодинаміка**

Венітан® гель містить  $\beta$ -есцин. Есцин – це природна суміш тритерпенових сапонінів, отриманих з насіння кінського каштана (*Aesculus hippocastanum* L.), які мають протинабрякові, венотонічні властивості і протизапальну активність. Крім того, есцин діє на початковій стадії запального процесу, яка пов'язана з підвищеною мембранною і капілярною проникністю і продукуванням ексудату у прилеглі тканини.

Есцин проявляє антисеротоніновий та антигістамінний ефект.

Есцин інгібує активність простагландин-синтетази. Цей фермент необхідний для утворення простагландинів, які відіграють важливу роль у механізмі запалення.

Есцин запобігає зниженню вмісту АТФ в ендотеліальних клітинах і підвищує активність фосфоліпази А2, ферменту, що відповідає за вивільнення попередників медіаторів запалення.

Есцин знижує активність лізосомальних ферментів, які розщеплюють протеоглікани у стінках капілярів. Це збільшує резистентність капілярів, знижує їхню проникність, зменшуючи таким чином кількість ексудату та утворення набряків.

Венітан® гель призначений для полегшення таких явищ як набряк, відчуття тяжкості і втоми у ногах, спричинені веностазом нижніх кінцівок. Він є добрим

доповненням до компресійної терапії (еластичний бандаж, еластичні панчохи, пов'язки). Крім того, гель зменшує набряк і прискорює резорбцію гематом від ударів і внаслідок інфузій чи ін'єкцій.

Венітан® гель виготовлений на особливій термочутливій основі і легко наноситься на шкіру та сприяє поступовому вивільненню активної речовини.

## **Показання**

Варикозне розширення вен, набряки ніг і больові відчуття, пов'язані з венозною недостатністю, посттравматичні гематоми і гематоми після ін'єкцій та інфузій.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату, ушкодження шкіри (наприклад, опіки, екзема, відкриті рани).

## Належні заходи безпеки при застосуванні

Не наносити гель на запалену шкіру, відкриті рани та слизові оболонки. Не втирати при нанесенні. При виникненні запалення шкіри, тромбофлебіту, сильного болю, раптового набряку однієї або обох ніг, серцевої або ниркової недостатності слід негайно звернутися до лікаря. При раптовій появі виражених симптомів венозної недостатності (набряк, зміна кольору шкіри, відчуття напруження та біль), особливо на одній кінцівці, слід виключити тромбоз вен нижніх кінцівок.

Застосування гелю при варикозному захворюванні вен не замінює інших профілактичних або лікувальних заходів (наприклад, носіння підтримуючих еластичних панчіх, обливання холодною водою).

Запобігати потраплянню гелю в очі та на слизові оболонки. Старанно мити руки після кожного нанесення гелю.

Гель містить метилпарагідроксибензоат (E 218), який може спричинити алергічну реакцію (у тому числі відстрочену), а у виняткових випадках – бронхоспазм, та пропіленгліколь (E 1520), здатний спричинити подразнення шкіри.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома. Не рекомендується застосовувати гель на одній ділянці шкіри разом з іншими засобами для місцевого застосування.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Через відсутність відповідних даних Венітан® гель не слід застосовувати у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

Гель наносити тонким шаром на ушкоджену ділянку шкіри та навколо неї 2-3 рази на добу.

Не втирати.

Тривалість лікування залежить від вираженості терапевтичного ефекту. Якщо після 14 днів терапії покращання не настає, слід звернутися до лікаря. Терапію можна продовжувати до 8 тижнів або до зменшення симптомів.

### **Діти**

Досвіду застосування препарату дітям недостатньо, тому не рекомендується застосовувати його пацієнтам цієї вікової категорії.

### **Передозування**

Немає повідомлень щодо передозування.

### **Побічні реакції**

Можливі реакції гіперчутливості, включаючи дерматит, у тому числі алергічний, шкірні висипання, свербіж, еритему, відчуття печіння шкіри, бронхоспазм. У разі виникнення таких реакцій необхідно припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

### **Термін придатності**

2 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка**

По 50 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

Салютас Фарма ГмбХ.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Ланге Герен 3, гемах ден лагепланен № 1-5, 39171 Сюзеталь, район  
Остерведінген, Саксонія-Ангальт, Німеччина.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).