

Склад

5 мл сиропу містить:

- чебрецю трави екстракт етанолових гліцеринового водний (Thymus vulgaris, 1: 4) - 0,24 г;
- первоцвіту весняного коренів екстракт етанолового-гліцеринового-водний (Primula veris, 1: 3) - 0,13 г;
- трави ехінацеї пурпурової екстракт сухий (Echinacea purpurea, 6-8: 1), ст. 4% поліфенолів - 0,04 г;

допоміжні речовини: сахароза, гліцерин, мед, ефірна олія анісу, ефірна олія сосни, вода очищена, бензоат натрію.

Сироп містить 2% спирту.

Лікарська форма

Сироп. Трав'яна формула для полегшення відхаркування.

Фармакологічні властивості

Містить екстракти первоцвіту, чебрецю, ехінацеї; мед, ефірні масла анісу і сосни. Екстракти чебрецю і первоцвіту традиційно використовуються для полегшення кашлю. Ефірні олії та флавоноїди трави чебрецю чинять бронхолітичну, секретолитическое, антисептичну та антибактеріальну дію, таким чином сприяють швидкому розчиненню мокротиння, що накопичилася в дихальних шляхах, зменшують кашель, полегшують дихання, а також впливають на збудників інфекції. Сапоніни з екстракту кореня первоцвіту сприяють посиленню бронхолегеневої секреції, розрідженню мокротиння, що полегшує його евакуацію. Активні компоненти сиропу сприяють утворенню захисної плівки на слизовій дихальних шляхів, знижуючи роздратування кашльових рецепторів, що пригнічує кашльовий рефлекс. Екстракт ехінацеї і мед зміцнюють захист організму.

Показання

Бронхочист сироп розроблений для підтримки нормальної функції слизової оболонки дихальних шляхів, полегшує стани, пов'язані з роздратуванням дихальних шляхів при кашлі.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, цукровий діабет, для дітей молодше 12 років. З обережністю застосовувати в період вагітності та годування груддю. З особливою обережністю застосовувати пацієнтам з гастритом і виразковою хворобою.

Особливості застосування

Рекомендована добова доза не повинна бути перевищена. Сироп містить активні інгредієнти рослинного походження, тому його колір в процесі зберігання може змінюватися. Однак, оскільки рослинні екстракти стандартизовані, ефект препарату залишається незмінним.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Сироп під час вагітності та в період лактації застосовують тільки з обережністю і якщо це рекомендовано лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям старше 12-ти років приймати 5 мл сиропу (одна мірна ложка) 3-5 разів на день.

Перед прийомом необхідно струсити флакон.

Рекомендована тривалість використання - один тиждень.

Діти

Дітям з 12 років.

Побічні реакції

Шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота і біль в животі) і алергічні реакції. Надмірне використання препаратів на основі кореня первоцвіту може викликати розлади шлунка, блювоту і діарею.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі, в захищеному від світла та вологості місці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 200 мл сиропу у флаконі з мірною ложкою в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ФАРМАНОВА Д.О.О, Сербія.