

## **Склад**

*діючі речовини:*

100 мл препарату містить: Hypericum (Звіробій) D1 15 мл, Ginkgo (Гінкго) D6 10 мл, Conium (Болиголов) D6 10 мл, Ginseng (Женьшень) D6 10 мл, Arnica (Арніка) D12 10 мл;

*допоміжні речовини:* етанол 43 % (м/м), вода очищена.

1 мл розчину містить 25 крапель.

## **Лікарська форма**

Краплі оральні.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, від жовтуватого до червонувато-жовтого кольору рідина, без специфічного запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Чинить комплексну ноотропну, вазоактивну та адаптогенну дії: усуває спазми судин головного мозку, покращує стан церебральної гемодинаміки та живлення тканин мозку киснем, нормалізує обмінні процеси та енергетичний потенціал нервових клітин, покращує реологічні властивості крові та стан мікроциркуляції головного мозку. Завдяки комплексній дії сприяє усуненню симптомів, що розвиваються внаслідок порушень церебрального кровообігу та обмінних процесів головного мозку. Покращує пам'ять, збільшує концентрацію уваги та швидкість психомоторних реакцій при виконанні розумових завдань.

## **Фармакокінетика**

Немає даних про фармакокінетичні властивості.

## **Показання**

Симптоматичне лікування погіршення пам'яті та концентрації уваги, пов'язаних із зниженням ефективності роботи головного мозку.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

На цей час немає інформації щодо взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами.

Несприятливий вплив на дію гомеопатичних лікарських засобів можуть спричинити загальні шкідливі фактори способу життя, вживання стимуляторів, неправильне харчування.

## **Особливості застосування**

Меморія®, краплі оральні, не слід застосовувати пацієнтам з алкогольною залежністю, оскільки в одній дозі препарату (5/10 крапель) міститься 80/160 мг спирту.

Вміст спирту слід враховувати також при застосуванні препарату вагітним, жінкам, які годують груддю, та пацієнтам з високим ризиком захворювань печінки та ризиком нападів епілепсії.

Через можливу фотосенсибілізацію (в зв'язку із вмістом звіробою) слід уникати інтенсивних сонячних променів.

На початку лікування препаратом можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай не є шкідливою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату потрібно припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування лікарського засобу слід припинити.

Довготривале лікування гомеопатичними лікарськими засобами має контролювати лікар з досвідом застосування гомеопатичних препаратів, оскільки можуть виникнути симптоми, які не вказані в інструкції для медичного застосування.

Оскільки Меморія® містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Лікарський засіб не впливає або чинить зовсім незначний вплив на здатність керувати транспортними засобами або іншими механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Жодного ризику при застосуванні препарату у період вагітності або годування груддю на сьогодні не виявлено. Лікарський засіб можна застосовувати у період вагітності або годування груддю у випадках, якщо очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

## **Спосіб застосування та дози**

*Дорослим:* на початку лікування застосовують по 10 крапель препарату, розведених в невеликій кількості води, кожні півгодини-годину не більше 8 разів на добу. Після покращення стану частота прийому лікарського засобу зменшується до 3 разів на добу. Рекомендується застосовувати за 30 хвилин до або через 1 годину після їди, потримавши препарат деякий час у роті перед проковтуванням.

Якщо симптоми нарастають чи не спостерігається покращення стану після 4 тижнів лікування, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Курс лікування залежно від тривалості захворювання та тяжкості стану визначається лікарем.

## **Діти**

Застосування лікарського засобу дітям (віком до 18 років) не рекомендується через недостатність даних щодо застосування.

## **Передозування**

Випадки передозування не виявлені.

## **Побічні реакції**

Можливий розвиток реакцій гіперчутливості.

У виняткових випадках після застосування препаратів, які містять звіробиї, можливі прояви фотосенсибілізації, що зникають після зменшення дози або

відміни препарату.

### **Термін придатності**

5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

### **Умови зберігання**

Лікарський засіб зберігати у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці, при температурі не вище 30 °С, у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 20 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

Ріхард Біттнер АГ.

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).