

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить олії м'яти перцевої в перерахуванні на 50 % ментол – 2,5 мг;

*допоміжні речовини:* цукор кондитерський, тальк, кальцію стеарат.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* таблетки білого кольору, з рискою і фаскою, плоскоциліндричної форми.

## **Фармакотерапевтична група**

Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Код АТХ А04А D.

## **Фармакодинаміка**

М'ятні таблетки, стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом послаблюють відчуття нудоти і попереджають блювання, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.

## **Фармакокінетика**

Не вивчалась.

## **Показання**

Симптоматичне лікування нудоти, блювання, спазмів гладких м'язів шлунково-кишкового тракту, відчуття гіркоти в роті.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Цукровий діабет, круп, спазмофілія, бронхіальна астма. Дитячий вік до 3 років.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не виявлена.

## **Особливості застосування**

Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.

*Якщо у вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.*

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат загалом не впливає на здатність керувати автомобілем і займатися іншими видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій. У разі появи ознак побічної дії препарату (див. «Побічні реакції») необхідно уникати керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застосування препарату у період вагітності можливе тільки тоді, коли очікувана користь від лікування матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.

## **Спосіб застосування та дози**

Призначати по 1-2 таблетки під язик. Максимальна доза препарату для дорослих і дітей віком від 12 років – 8-10 таблеток на добу. Для дітей віком від 3 до 12 років – 3-5 таблеток на добу.

Курс лікування залежить від досягнутого ефекту лікування.

## **Діти**

Не застосовувати дітям віком до 3 років.

## **Передозування**

Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця.

## **Побічні реакції**

Біль у ділянці серця; алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипи, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, дерматит; в окремих випадках – запаморочення. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

*Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в інструкції для медичного застосування лікарського засобу.*

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 10 таблеток у блістерах.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПРАТ «ФІТОФАРМ».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 2.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).