

Склад

1 капсула містить: *активні інгредієнти:*

S-аденозил-L-метіонін – 200 мг (mg), L-метилфолат – 0,4 мг (mg), що еквівалентно 0,4 мг (mg) фолієвої кислоти, вітамін B12 у формі метилкобаламіну – 250 мкг (µg);

допоміжні речовини: наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза, лактоза, кальцію стеарат, діоксид кремнію аморфний (орісіл); оболонка капсули: желатин.

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) НА 100 г (g) ДОБАВКИ: білки – 15,0 г (г), вуглеводи – 1,1 г (г), жири – 0 г (г); 64,4 kcal (ккал) / 269,4 kJ (кДж).

ПОЖИВНА (ХАРЧОВА) ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ (КАЛОРІЙНІСТЬ) ЩОДЕННОЇ КІЛЬКОСТІ, 2 капсули: білки – 0,13 г (г), вуглеводи – 0,01 г (г), жири – 0 г (г); 0,54 ккал (kcal) / 2,26 кДж (kJ).

Опис

ДЕПРІЛІУМ® містить науково обґрунтовану комбінацію речовин природного походження для нормалізації психоемоційного стану, за рахунок покращення обміну нейротрансмітерів у головному мозку, що веде до: зменшення таких проявів як пригнічений настрій, апатія, швидка втомлюваність, знижена самооцінка тощо; покращення настрою та самопочуття; підвищення працездатності та концентрації уваги; покращення когнітивних функцій.

S-аденозил-L-метіонін (S-adenosyl-L-methionine, SAMe) – речовина природного походження, що присутня у всіх клітинах організму та бере участь у понад 200 метаболічних процесах. SAMe має тривалу історію використання, у т.ч. у Європейському Союзі та США. Чисельні клінічні дослідження S-аденозил-L-метіоніну довели його ефективність при депресивному синдромі. S-аденозил-L-метіонін характеризується швидкістю настання фізіологічного ефекту та сприятливим профілем безпеки. S-аденозил-L-метіонін проникає через гематоенцефалічний бар'єр, де бере участь у синтезі нейромедіаторів ЦНС (зокрема серотоніну, катехоламінів, мелатоніну, гістаміну).

L-метилфолат (L-methylfolate) – біологічно активна форма фолієвої кислоти (вітамін B9), яка є важливою поживною речовиною і міститься головним чином в зеленому листі та овочах. Фолієва кислота легко руйнується при приготуванні та обробці їжі, на її рівень в організмі впливає багато чинників. За даними низки досліджень, при депресіях спостерігається зниження рівня фолату у сироватці. L-метилфолат не потребує додаткових перетворень в організмі і є єдиною формою

фолієвої кислоти, яка проникає через гематоенцефалічний бар'єр. Метилфолат відіграє важливу роль у синтезі основних нейромедіаторів ЦНС, амінокислот, білків та нуклеїнових кислот. L-метилфолат сприяє зменшенню проявів депресивного синдрому.

Метилкобаламін (methylcobalamin) – одна з активних форм вітаміну B12. У порівнянні з іншими формами вітаміну B12, метилкобаламін на субклітинному рівні краще транспортується в органели нейронів. Саме завдяки такій властивості він є більш ефективним для покращення психоемоційного стану та нормалізації функціонування нервової системи. Низький рівень вітаміну B12 спостерігається у людей з депресивним синдромом. Його обмін тісно пов'язаний з фолатом та SAMe; метилкобаламін грає важливу роль у метаболізмі нейромедіаторів. Вітамін B12 бере участь у поділі клітин та формуванні крові, і має вирішальне значення для нормального функціонування нервової тканини. Метилкобаламін відповідає за регенерацію і нове утворення оболонок нервового волокна (також відомих як оболонки мієліну), які захищають нерви і забезпечують правильну і ефективну передачу нервового імпульсу.

Рекомендації до застосування

ДЕПРІЛІУМ® рекомендований як додаткове джерело амінокислот та вітамінів для нормалізації функціонування нервової системи при пригніченому психоемоційному стані, апатії, зниженій концентрації уваги та працездатності, пов'язаними з порушенням обміну центральних нейромедіаторів (серотоніну, норадреналіну тощо). ДЕПРІЛІУМ® має нейропротекторні властивості, сприяє покращенню настрою і самопочуття, підвищує когнітивні функції та працездатність. ДЕПРІЛІУМ® компенсує дефіцит фолієвої кислоти та вітаміну B12 в організмі, що сприяє нормалізації психоемоційного стану.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1-2 капсулі на день за 30 хв до їди або через 1 год після їди (але не пізніше 16 години), запиваючи достатньою кількістю питної води.

Рекомендований курс прийому: 1-3 місяці. За необхідності курс прийому може бути скореговано лікарем..

Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Вагітність, період лактації, дитячий вік, індивідуальна непереносимість компонентів, біполярні розлади, злоякісні новоутворення, захворювання системи крові.

Термін придатності

24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури від 4 °С до 25 °С.

Упаковка

Капсули з масою вмісту 340 мг \pm 7,5 %, по 30 капсул в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ "Нутрімед"

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

03150 Україна, м. Київ, вул. Предславинська 43/2