

## **Склад**

*діюча речовина:* метадоксин;

1 таблетка містить метадоксину 0,5 г;

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремний діоксид колоїдний безводний, натрію кроскармелоза.

## **Лікарська форма**

Таблетки.

*Основні физико-химические свойства:* таблетки бело- или бело-с кремуватим відтінком цвета, плоскоцилиндрической форми, с фаскою и рискою; на верхние одного из боков таблетки нежданного товарного знака пищевого поведения.

## **Фармакотерапевтична група**

Средства, применяемые при алкогольной зависимости. Код АТХ N07B B.

## **Фармакодинаміка**

Антиалкогольный, дезинтоксикационный, гепатопротекторный засіб. Активные ферменты печени, которые поглощают часть метаболитических соединений этанола (алкогольдегидрогеназу и ацетальдегидрогеназу), которые спривають прискоренню процесса введения этанола и ацетальдегиду в организм, снижают их токсичность. Поддерживает стойкость гепатоцитов к продуктам перекисного окисления липидов, индуктивного выброса различных токсических агентов, зокрема этанола. Задерживает накопление жиров в гепатоцитах, що попереджує утворення жировоев инфильтрации печени. Перешкоджає утворенню фибронектину и колагену, що гальмує процесс розвитку цирозу печени.

Активировует холин- и ГАМК-ергическую нейромедицинскую систему, внаслідок чого покращується функціонування мислення и короткой памяти. Перешкоджає виникненню рухового збудження, спричиненого етанолом. Чинить неспецифическую антидепрессивную и анксиолітичну дію, снижающую тягу к алкоголю. Скорочує час купіювання абстинентного синдрому, снижуює психические и соматические проявления похмального синдрому.

## **Фармакокінетика**

Метадоксин быстро абсорбируется из травяного тракта, имеет высокую биодоступность (60-80 %). Связывание с білками плазмы крови становит около 50%. Метаболизується в печач до активних метаболитов – пиридоксину и пиролидон-карбоксилату. Период введения метадоксину при внутривенном или парентеральном введении становит 40-60 хвилин. 45-50 % метадоксину виводиться из сечею протягом 24 года, 35-50 % – из калом протягом 96 год.

## **Показання**

- Уменьшение токсического действия алкоголя.
- Острая алкогольная интоксикация (легкой и средней тяжести).
- Алкогольный абстинентный синдром.
- Хронический алкоголизм.
- Комплексная терапия заболеваний печени, особенно алкогольной этиологии.

## **Протипоказання**

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При сумеречном застоє метадоксин через подкисление декарбок西兰ювання леводопы снижает її терапевтическую ефективность.

### **Особливості застосування**

Снижает терапевтический эффект леводопии, особенно его след с осторожностью застопорит при приеме Паркинсона на тлетерапию леводопою.

При станах тяжелой алкогольной интоксикации, що супроводжуються втратою свідомості, неприборкуваним блюванням тощо, перорально застосування лікарских засобів є недоцільним.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не влияет.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не используют.

### **Спосіб застосування та дози**

Препарат призначають дорослим внутрішньо.

Для зменшення токсичної дії алкоголю: 2 таблетки за 30-60 хвилин до вживання алкоголю або 1 таблетка за 30-60 хвилин до вживання алкоголю та 1 таблетка протягом 30 хвилин після вживання алкоголю.

При гострій алкогольній інтоксикації легкої та середньої тяжкості, алкогольному абстинентному синдрому: по 1 таблетці 2 рази на добу за 15-30 хвилин до вживання їжі, дозу можна збільшити до 3 таблеток на добу. Курс терапії – 3-7 днів залежно від стану хворого.

При комплексній терапії хвороб печінки та хронічному алкоголізмі: по 1 таблетці 2 рази на добу за 15-30 хвилин до вживання їжі. Максимальна добова доза – 3 таблетки. Курс терапії – не менше 90 діб.

Діти.

Не слід застосовувати дітям через відсутність досвіду застосування в даній віковій групі.

Передозування

Про виски передозування метападоксином не повідомлялось.

Побочные эффекты

Аллергические реакции.

Термин придатности

3 роки.

Умови зберігання

Сбереги в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Сбереги у недоступного для дітей місці.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах; по 2 блистера в пачці.

Категория разрешения

Без рецепта.

Виробник

Товариство с додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ».

Адреса Украина, 65025

, г. Киев, ул. Одесса, 21-й км. Старокиевские дороги, 40-А.

## **Діти**

Не следует применять детям из-за отсутствия опыта применения в данной возрастной группе.

## **Передозування**

Про випадки передозування метадоксином не повідомлялося.

## **Побічні реакції**

Алергічні реакції.

## **Термін придатності**

3 года.

## **Умови зберігання**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Товариство з додатковою відповідальністю «ІНТЕРХІМ».

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 65025, м. Одеса, 21-й км. Старокиївської дороги, 40-А.

## **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).