

Склад

діюча речовина: глюкоза;

100 мл розчину містять глюкози (в перерахунку на глюкозу безводну) 10 г;

допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.

Лікарська форма

Розчин для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна або ледь жовтувата рідина, теоретична осмолярність – 555 мосмоль/л, рН 3,5-6,5.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Показання

- гіпоглікемія;
- парентеральне харчування;
- порушення, пов'язані з підвищеним розщепленням білка внаслідок гіпоергозу.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовувати внутрішньовенно краплинно. Доза для дорослих становить до 1500 мл на добу. Максимальна добова доза для дорослих становить 2 000 мл. У разі необхідності максимальна швидкість введення для дорослих – 150 крапель за хвилину (500 мл/год).

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Термін придатності

5 років.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.

Фармакотерапевтична група

Розчини для парентерального харчування.

Код АТХ V06D C01.

Упаковка

По 200 мл у пляшках.

Виробник

Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкава, б. 55 або Україна, 23219, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул. Немирівське шосе, б. 84А.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).