

## **Склад**

*діюча речовина:* кропиви листя (*Urticae folium*);

1 пачка містить кропиви листя (*Urticae folium*) – 50 г.

## **Лікарська форма**

Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:*

подрібнена сировина: шматочки листків різної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм. Колір темно-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий;

порошок крупний: шматочки листків різної форми, які проходять крізь сито з отворами діаметром 2 мм. Колір темно-зелений. Запах слабкий. Смак гіркуватий

## **Фармакотерапевтична група**

Гемостатичні засоби. Код АТХ В02В Х.

## **Фармакодинаміка**

Біологічно активні речовини препарату чинять кровоспинну, діуретичну, загальнозміцнювальну, протизапальну та судинозвужувальну дію, сприяють збільшенню вмісту гемоглобіну та кількості еритроцитів, нормалізують склад крові, знижують рівень цукру в крові, сприяють регенерації слизових оболонок травного тракту, нормалізують ліпідний обмін.

## **Показання**

Легеневі, кишкові, маткові, гемороїдальні та інші кровотечі; анемії різної етіології; захворювання травного тракту (гастрити, коліти, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки).

## **Протипоказання**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові; кровотечі, спричинені кістою, поліпами та іншими пухлинами матки та її придатків; артеріальна гіпертензія.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не описана.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Протипоказаний у період вагітності. У жінок, які годують груддю, посилює лактацію.

### **Спосіб застосування та дози**

2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хвилин, процідити, залишок віджати у проціджений настій. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Застосовувати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хвилин до їди: дорослим та дітям віком від 12 років – по ¼-½ склянки, дітям віком 5-7 років – по 1 столовій ложці, дітям віком 7-12 років – по 2 столові ложки.

Перед застосуванням настій збовтати.

### **Діти**

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

### **Передозування**

Повідомлення відсутні.

### **Побічні реакції**

Нудота, блювання, діарея, біль у ділянці шлунка; алергічні реакції (включаючи гіперемію, висипання, свербіж, набряк шкіри).

### **Термін придатності**

2 роки.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці; приготовлений настій – у прохолодному місці не більше 2 діб.

### **Упаковка**

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

### **Категорія відпуску**

Без рецепта.

### **Виробник**

ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».

### **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

69050, Україна, м. Запоріжжя, вул. Складська, 4.