

Склад

діючі речовини: активоване екстракт прополісу, бджолиний віск, екстракти чорної тополі, живокосту лікарського, звіробію;

допоміжні речовини: твердий жир, полісорбат, диметилсульфоксид, поліетиленоксид, кислота аскорбінова.

Опис

Ректальні супозиторії «Апі-норм» - збалансована композиція на основі продуктів бджільництва і рослинних компонентів. Активує власні захисні сили організму. Володіє протизапальними та регенеруючі властивості, запобігає розвитку ускладнень і можливих рецидивів при захворюваннях передміхурової залози та інших внутрішніх органів малого таза.

Особливості

- Препарат не має негативної дії на організм людини, не викликає ускладнень при тривалому використанні, добре засвоюється організмом.
- Ректальні супозиторії мають виражену протизапальну, адаптогенну, антиінфекційне і спазмолітичну дію.
- Препарат сумісний з іншими лікувальними та профілактичними препаратами.
- «Апі-норм» активує імунну систему, підвищує життєвий тонус, запобігає запальним і хронічні захворювання органів малого таза.

Показання

В урології: при запальних і хронічних захворюваннях передміхурової залози, аденоми простати, сечовивідних шляхів, циститах, пієлонефритах, уретритах.

У проктології: при запаленнях, ерозіях, поліпозах, тріщинах слизової прямої кишки, проктитах, гемороїдальних вузлах, прискорює загоєння післяопераційних ран.

Особливості застосування

Під час лікування забороняється вживати алкогольні напої.

У випадках підозри на злоякісні новоутворення препарат застосовують під наглядом лікаря.

Можливі алергічні реакції: печіння, гіперемія, висип, почервоніння і свербіж шкіри. Про виникнення цих або інших незвичайних побічних реакцій слід повідомити лікаря.

Досліджень безпеки та ефективності препарату в дитячому віці, в періоди вагітності та лактації не проводилися, тому для цих категорій використання препарату не рекомендується.

З обережністю слід застосовувати препарат при підвищеній чутливості до його складових.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Застосування препарату не рекомендується.

Спосіб застосування та дози

Перед використанням препарату, для поліпшення всмоктування через пряму кишку діючих речовин, рекомендується спорожнити кишечник і ввести супозиторій у пряму кишку на глибину половини вказівного пальця.

Рекомендоване дозування:

- при запальних захворюваннях внутрішніх органів малого тазу (гострих бактеріальних простатитах, уретритах, циститах, пієлонефритах, проктитах, запаленнях слизової прямої кишки, гемороїдальних вузлах, після операційних ран) - по одній свічці на ніч протягом 10-15 днів;
- при хронічних захворюваннях вище зазначених органів малого таза і хронічному простатиті, що провокує запалення шийки сечового міхура, сім'яних пухирців, придатків яєчників, задньої уретри, препарат застосовують як самостійно, так і в комплексній терапії по одній свічці 2 рази на добу протягом 10-15 днів (при наявності залишкових симптомів, після тижневої перерви, продовжити застосування препарату - по одній свічці на ніч протягом 10 днів);
- при аденоматозних трансформаціях передміхурової залози, наявності аденоматозних вузлів і порушення кровопостачання в передміхуровій залозі, препарат застосовують як самостійно, так і в комплексній терапії трьома курсами по одній свічці на ніч протягом 20-ти днів з перервами між курсами по 14 днів.

Продовження застосування препарату призначають індивідуально залежно від самопочуття, результатів діагностики та аналізів.

Діти

Застосування препарату не рекомендується.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від +4 °С до + 21 °С в темному, недоступному для дітей місці.

Виробник

ТОВ "Нечурел Хелс", Україна.