

## **Склад**

*діюча речовина:* 1 капсула містить 150 мг (0,15 г) ефірної олії лаванди;

*допоміжні речовини:* желатин, гліцерин, хіноліновий жовтий (E 104), сансет жовтий (E 110), метакрилатний сополімер (тип А), натрію лаурилсульфат, пропіленгліколь, полісорбат 80, гліцерол моностеарат.

## **Лікарська форма**

Капсули кишковорозчинні м'які.

*Основні фізико-хімічні властивості:* овальні жовті кишковорозчинні м'які капсули з прозорою рухомою світло-жовтою або зеленувато-жовтою рідиною.

## **Фармакотерапевтична група**

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.  
Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

## **Фармакодинаміка**

Тавіпеку притаманна секретолітична, відхаркувальна, муколітична, епітелізуюча, протизапальна, протимікробна, імуностимулююча дія.

Секретолітична дія препарату проявляється у підвищенні мукоциліарного кліренсу. Муколітична та відхаркувальна дія зумовлюється розрідженням слизу і посиленням функціональної активності війчастого епітелію, що сприяє швидшому та легшому вивільненню від слизу дихальних шляхів. Протимікробна та протизапальна активність Тавіпеку спричинена бактерицидними та протизапальними властивостями ефірної олії лаванди і проявляється у пригніченні загального росту бактерій.

Ефірна олія лаванди в дослідженнях *in vitro* пригнічує загальний ріст бактерій та грибів, у тому числі мікобактерій туберкульозу, при чому не впливає на

нормальну мікрофлору кишечника. Тавіпек дезактивує стафілококовий токсин – альфа-гемолізін та стрептококовий токсин – стрептолізін, токсини, що вивільняються патогенними бактеріями. Тавіпек стимулює неспецифічні ланки імунітету шляхом активації клітинного імунітету, підвищення фагоцитарної активності лейкоцитів.

## **Фармакокінетика**

Після перорального прийому 1,8-цинеолу у кишковорозчинних капсулах, мічених атомом ефірної олії лаванди, при максимальному періоді перебування у травному тракті біодоступність препарату не змінюється.

## **Показання**

- гострий бронхіт;
- хронічний бронхіт;
- бронхектатична хвороба;
- кашель курця;
- синусит.

## **Протипоказання**

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, виразкова хвороба, гіперацидний гастрит, гострий гепатит, панкреатит, нефрит.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не виявлена.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не впливає на здатність керувати автомобілем або іншими механічними засобами.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Застереження щодо прийому препарату у період вагітності або годування груддю відсутні.

## **Спосіб застосування та дози**

Дорослим та дітям віком від 12 років – по 1-2 капсули 3 рази на добу, не розжовуючи, під час їди. Термін лікування залежить від характеру та тяжкості захворювання і визначається лікарем індивідуально.

## **Діти**

Препарат застосовувати для лікування дітей віком від 12 років.

## **Передозування**

Не описане. Симптоми передозування ефірною олією лаванди невідомі. При передозуванні імовірно виникнення нудоти та інших гастроінтестинальних скарг.

## **Побічні реакції**

Рідко може виникати відрижка, короткочасна нудота, блювання, біль у животі, дисгевзія. Не можна виключити можливість розвитку алергічних реакцій, включаючи шкірні висипання. При видиху імовірна наявність запаху лавандової олії, що не спричиняє неприємних відчуттів.

## **Термін придатності**

3 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в картонній упаковці для захисту від світла при температурі не вище 30 °С.

## **Упаковка**

По 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

Фармацевтише фабрік Монтавіт ГмбХ.

## **Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Зальбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрія.

### **Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).