

Склад

діючі речовини: 2,2 мл розчину містять: Acidum arsenicosum D28 – 22 мг, Apisinum D8 – 22 мг, Argentum nitricum D6 – 22 мг, Baptisia tinctoria D4 – 22 мг, Barosma D8 – 22 мг, Berberis vulgaris D4 – 22 мг, Capsicum annuum D6 – 22 мг, Chondrodendron tomentosum D6 – 22 мг, Colibacillinum Nosode D13 – 22 мг, Coxsackie Virus A9 Nosode D8 – 22 мг, Cuprum sulfuricum D6 – 22 мг, Equisetum hiemale D4 – 22 мг, Hepar sulfuris D10 – 22 мг, Hydrargyrum bichloratum D8 – 22 мг, Lytta vesicatoria D6 – 22 мг, Natrium pyruvicum D10 – 22 мг, Orthosiphon aristatus D6 – 22 мг, Pyelon suis D10 – 22 мг, Pyrogenium Nosode D198 – 22 мг, Smilax D6 – 22 мг, Solidago virgaurea D3 – 22 мг, Terebinthina laricina D6 – 22 мг, Ureter suis D10 – 22 мг, Urethra suis D10 – 22 мг, Vesica urinaria suis D8 – 22 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма

Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Лікарський засіб чинить протизапальну, імуномодулюючу, репаративну, діуретичну, спазмолітичну та антисептичну дії. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до його складу.

Показання

У комплексному лікуванні підгострих та хронічних захворювань нирок і сечовивідних шляхів, таких як цистит, цистопієліт, сечокам'яна хвороба, гідронефрози; нічні енурези, дизурія при I стадії аденоми простати, звуження сечовивідного каналу; артеріальна гіпертензія при гострому гломерулонефриті; для стимуляції екскреторних функцій нирок, у т. ч. у випадку гіпергідрозів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома. При застосуванні будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем щодо можливості одночасного застосування.

Особливості застосування

Якщо симптоми не зникають або стан погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.

Цей лікарський засіб містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.

На початку лікування можливе короточасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування лікарського засобу слід припинити та звернутися за консультацією до лікаря.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Питання щодо доцільності застосування лікарського засобу вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує індивідуально лікар з урахуванням ризику/користі.

Спосіб застосування та дози

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл.

Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, а при необхідності – внутрішньовенних ін'єкцій 1-3 рази на тиждень.

Курс лікування – 4-6 тижнів.

Як відкрити ампулу

Відкривати обережно.

Розрізати скляну ампулу не обов'язково. Тримайте ампулу верхньою частиною догори під нахилом; рідину, яка знаходиться у верхній частині ампули, струсіть

вниз. Відламайте верхню частину ампули, де знаходиться кольорова позначка.

Невикористаний залишок розчину вилити.

Діти

Препарат застосовувати дітям віком від 6 років.

Передозування

Не відзначалося.

Побічні реакції

В окремих випадках через індивідуальну чутливість до компонента препарату *Solidago virgaurea* (золотушник звичайний) можливе підвищене слиновиділення. У такому випадку прийом препарату слід тимчасово припинити до зникнення проявів алергічної реакції. У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (до анафілактичної реакції).

Термін придатності

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня вказаного місяця.

Умови зберігання

Спеціальних умов зберігання не потребує. Зберігати у недоступному для дітей місці!

Упаковка

По 5 ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску

За рецептом.

Виробник

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/Dr. -Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).