

## **Склад**

1 таблетка містить:

*Активні інгредієнти:* екстракт трави золототисячника звичайного (*Centaurium erythreal*), порошкоподібний; екстракт кореня любистку лікарського (*Levisticum officinale*), порошкоподібний; екстракт листя розмарину лікарського (*Rosmarinus officinalis*), порошкоподібний;

*допоміжні речовини:* лактоза

наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза, стеарат кальцію.

## **Властивості**

Функціональні властивості дієтичної добавки Ренохелс обумовлені фізіологічною активністю біологічно активних речовин, що входять до складу її активних інгредієнтів.

### *Екстракт трави золототисячника звичайного*

Екстракт трави золототисячника звичайного містить такі біологічно активні речовини: гексазаміщення ксантони; монотерпенові глікозиди: генціопікрін, генціопікрозід, сверціамарін; ефірні масла; флавоноїди: лютеолн, апігенін, скутеляреїн; фенолокислоти (р-кумарова, гідроксіфенілоцтова, ферулова, протокатехова) кумарин; жирні кислоти нікотинамід та інші. Виявляє антибактеріальні та діуретичні властивості, сприяє виведенню сечових каменів.

### *Екстракт кореня любистку лікарського*

Екстракт кореня любистку лікарського містить ефірну олію. Головні складові масла - фталіди, серед яких ідентифікован лігустілід, 3-бутілфталід, 3-бутіліденфталід (лактон любистку), седанолід, лактон седанової кислоти. Серед інших складових -  $\alpha$ - і  $\beta$ -пінен,  $\alpha$ - і  $\beta$ -феландрен,  $\alpha$ -терпінеол, ефіри оцтової і валерианової кислот і вільна оцтова, ізовалеріанова, масляна і бензойна кислоти. Певне фізіологічне значення в сукупному фармакологічному ефекті мають кумарини (вільне володіння кумарин, умбеліферон) і фурукумарини (псорален, бергаптен), лецитин, яблучна і ангелікова кислоти, дубильні речовини, макро- і мікроелементи: Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Ba, Se, Sr, Ti, Rb, Mo, Pb, Zr, Cd, V, As, Sn, Ag, Bi, Cs, Hg, Sb, Sc, а також крохмаль, камедь, смоли.

### *Екстракт листя розмарину лікарського*

Розмарин лікарський - Офіційна рослина в багатьох країнах Європи. Трава розмарину лікарського включена до складу Європейської Фармакопеї. Трава містить ефірну олію, до складу якої входять борнілацетат, пінен, терпінеол, камфора, камфен, борнеол; ароматичні кислоти: розмаринова, хлорогенова і кавова; дітерпенові гіркоти: карнозол, карнозолова кислота, розмарідіфенол, розманол; тритерпенові кислоти: олеанолова і урсолова; флавоїди: апигенін, лютеолін, діосмін, діосметін, генкванін, гіспідулін, непетін, непітрін.

Біологічно-активні речовини, що входять до складу розмарину лікарського усувають спазми гладких м'язів сечовивідних шляхів та периферичних кровоносних судин.

Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу активних інгредієнтів Ренохелс, проявляють протизапальні, сечогінні та вазоділяційні властивості, сприяють усуненню спазму сечовивідних шляхів; посилює виділення солей сечової кислоти і змінює кислотність сечі, внаслідок чого сприяє нормалізації функціонального стану нирок при сечокам'яній хворобі, попереджує утворення та ріст конкрементів у сечовивідних шляхах.

### **Рекомендації щодо застосування**

За рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно-активних речовин (гексозаміщені ксантони, монотерпенові глікозиди, флаваноїди, фенолокислоти, ефірні олії, фталіди, дубильні речовини) з метою нормалізації функціонального стану нирок при сечокам'яній хворобі, профілактики утворення сечових каменів (у тому числі й після їх вилучення) в сечовивідних шляхах.

Не є лікарським засобом.

### **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, вагітність і період лактації, підвищена кислотність шлункового соку, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки, гломерулонефрит і пієлонефрит в стадії загострення, набряки внаслідок серцевої недостатності або порушень функції нирок.

### **Спосіб застосування та дози**

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим та дітям віком від 12 років і старше по 1 таблетці 3 рази на добу під час прийому їжі не розжовуючи, запивати склянкою (200 мл) питної води.

Тривалість застосування визначає лікар індивідуально. В середньому курс застосування складає 30 днів. За необхідності курс застосування за рекомендацією лікаря повторюють. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

*Особливості по застосуванню:* регулярне щоденне споживання є особливо важливим для профілактики утворення сечових каменів. Необхідно вживати достатню кількість рідини (біля 2л. на добу). Рекомендовано застосовувати повноцінний і збалансований раціон харчування, обмежувати тваринні жири, цукор, солодощі та алкоголь.

*Застереження щодо застосування:* не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

### **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C в сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

Таблетки масою 500 мг. №90 у контейнері полімерному, упакованому у картонну коробку.

### **Виробник**

ТОВ "Біхелс", Україна.